

حـيـاة النبـاتـات

مقدمة مبسطة للنباتات وفوائدها
مع قسم خاص بالتدريب والراجع




تأليف: چون سیمونز

ترجمة: د.أحمد خليل

لقد ظهرت أولى النباتات البسيطة على الكره الأرضية منذ أكثر من 2000 مليون سنة . وقد كانت نشأتها موقعة ناجحة بشكل أدى إلى وجود 360.000 نوع نباتي في العالم . والنباتات جزء أساسي في حياتنا ، فبدون النباتات ما تتوفر لنا الغذاء ولا اكسجين الهواء الذي نتنفسه .

ويبين كتاب حياة النباتات كيف تعيش النباتات وتنمو ، كيف تتکاثر وكيف تتكيف مع مختلف البيئات . ويصف الكتاب أيضاً كثيراً من طرق الاستفادة من النباتات . وتبين الرسوم التوضيحية الالهائية والجمالية الأخاذة التي تميز به النباتات .



لقد انضم جون سيمونز بعلم التاريخ الطبيعي منذ طفولته .

وكان مستولاً طلة الست عشرة سنة الماضية عن تشكيل مجموعات النباتات الطبيعية في العدائق النباتية . وقد اضطلع في هذه الآونة بعده أمور تتعلق بزراعة النباتات وعلومها .

وقد أولى اهتماماً خاصاً باستباطن سبل جديدة لتعريف الأطفال بعالم النباتات عن طريق المحاضرات والمعارض الخاصة .

حيـاة النبـاتـات

مقدمة مبسطة للنباتات وفوائدها
مع قسم خاص بالتدريب والراجع



تأليف: چون سیمونز
ترجمة: د.أحمد خليل



حِيَاةُ النَّبَاتَاتِ

المحتويات

الدى والتنوع	٨
كيف تنسب النباتات	١٠
الأماكن التي تعيش فيها النباتات	١٢
أجزاء النبات	١٤
التلقيح	١٦
انتشار البذور	١٨
الأنبات	٢٠
الوراثة والتغير	٢١
كيف تنمو النباتات	٢٢
طرق أخرى للتتكاثر	٢٤
طرق التغذية	٢٦
مواعيد الازهار	٢٨
غذا، تحت الأرض	٣٠
النسخ النباتى والقف	٣١
فوائد الأوراق	٣٢
فوائد السيقان	٣٤
فوائد البذور والثمار	٣٦
نباتات ما قبل التاريخ	٣٨
جلب النباتات	٤٠
فلاحة الأرض	٤٢
الحداثق عبر العصور	٤٤
التوازن في الطبيعة	٤٦
نباتات نادرة	٤٨

عندما تنظر إلى الخارج من نافذتك ، فهل يخطر ببالك إلى أي درجة تعتمد على النباتات ؟ فكر في الأشجار التي اقتطعناها لصنع منها ورق الكتب والجرائد والخانط الموجود في الصفحة المقابلة . وكذلك تستخدم كتل الخشب في صنع النوافذ والمناضد ، والقطن في صنع الستائر . وحتى أنواع البلاستيك التي نستعملها مصنوعة من الزيت الذي نتج من النباتات الميتة .

كذلك تمنعنا النباتات البهجة ، من الجيرانيوم داخل المنزل إلى الأزهار والخشائش والأشجار خارج المنزل . وأهم من ذلك كله ان النباتات تخرج الاكسجين في الهواء الذي تنفسه . ولو لا النباتات لنجد الاكسجين من الجو ، ولو لا وجود الاكسجين لهلك البشر وسائر الحيوانات .

ويشرح هذا الكتاب كيف تعيش النباتات وكيف يحسن الناس أو يسيئون استخدامها .


اسناد وتوضيحات	
حقائق وارقام	٤٩
شرح الكلمات	٥٠
طرق زراعة النباتات	٥٢
تجفيف وضغط النباتات	٥٤
تجارب على النباتات	٥٦
طباعة وصياغة	٥٨
فهرس الصور والكلمات	٦٠

المدى والتتنوع

يوجد أكثر من ٣٦٠ نوع من النباتات منتشرة في العالم .



تعيش أشجار المنغروف في الأماكن الطينية المالحة من مصايف الأنهر الاستوائية . وهي ذات جذور قوية تدعم ساقان الأشجار التي يجب أن تنمو قاتمة فوق الماء المالح ، ذلك لأن الأشجار لا يمكنها البقاء حية إذا غسلت أوراقها تحت الماء المالح .



في المناطق الجبلية التي تكتسحها الرياح لا ترتفع النباتات كثيراً عن سطح الأرض لحمايتها من قسوة الطقس . وتزهر نباتات سولدانيللا التي تعيش في جبال الألب بسرعة وبمجرد ذوبان الثلوج التي تغطيها .



نصف المليметр (٠٢٠ ر بوصة) والبكتيريا التي لا يمكن رؤيتها بالعين الواحدة على البسيطة منذ أكثر من ٢٠٠٠ مليون عام . ومنذ هذه البداية الأولى ، وشكل ، بل وتوجد آلاف مختلفة من وعبر ملايين السنين ، ظهرت أعداد الطرز النباتية . كذلك تتعدد أشكال ضخمة من النباتات المختلفة . وقد الأوراق وألوان الأزهار . وكل هذا تكاثرت النباتات التي تواءمت جيداً التنوع له مفاهيم ، فالخواص المظهرية للبقاء بينما بادت أعداد لا حصر لها . وكل نبات قد خلقت لتساعد النوع على البقاء والتكاثر .

وتعيش بعض النباتات آلاف السنين بينما لا يعمر البعض الآخر أكثر من أسباب قليلة . وبعض النباتات لها أزهار بينما البعض الآخر عديم الأزهار ، وبعضاها له جذور دون البعض الآخر . وكل طراز أو نوع نباتي مختلف عن أي نوع آخر .

تعمر نباتات كثيرة مدة أطول كثيراً من الإنسان أو الحيوانات . ومن أطول الأشجار عمراً صنوبر المخروط الشعيري الذي يعيش في الجبال البيضاء بكاليفورنيا ، ويقدر عمر اقدم هذه الأشجار بحوالى ٩٠٠٠ سنة .

النبات الحولي نبات يزهر وينتاج البذور ويموت في مدى عام واحد . وفي المناطق الصحراوية قد لا تمطر السماء سوى مرة واحدة في العام ، وحينئذ يستلزم الأمر أن تزهر الحوليّات الصحراوية وتنتج بذورها بسرعة قبل أن تجف التربة . إن عملية التزهير في الحوليّات الصحراوية عملية مثيرة للدهشة .



الأوراق :

يأخذ النبات الماء خلال جذوره ويخرجها خلال أوراقه . وكلما كانت الأوراق كبيرة زادت كمية الماء التي يفقدها . والنباتات التي تعيش في المناطق الدافئة الرطبة تكون أوراقها كبيرة لقدرتها على تعويض الماء، الذي تفقده . ومن أكبر الأوراق حجما الورقة المزدوجة لخيل جوز الهند التي يصل طولها - مع العنق - إلى حوالي 14 مترا (15 ياردة) . وفي الأماكن التي يكون جوها أكثر بروادة تكون الأوراق أصغر حجما ، كما في الأوراق البرية لنبات الصنوبر ، أو ينفس النبات أوراقه في الشتاء ، كما في أشجار البلوط مثلا .



الازهار :

تباعين الأزهار بشكل مذهل من حيث الشكل والحجم واللون . وشجرة أموروفالس العملاقة ذات ازهار صغيرة داخل غلاف ضخم ، وهي تنمو في غابات إندونيسيا . وبمقارنتها بزهرة اوركيد فاندا التي تعيش في الهند يتضح مدى التباين بين الأزهار .



اوركيد فاندا



امور فوفالس

يبلغ قطر أصغر النباتات الزهرية المعروفة من ٥ إلى ٧ من المليمتر (٠٠٣ إلى ٠٠٢ بوصة) فقط . والنبات اسمه وولفيا ، وهو من أقرباء الطحلب البطي الذي يوجد طافيا في المستنقعات . وهو عديم الجذور . أما ازهاره الدقيقة فستكون في الأوراق .



إن أكبر الأشجار حجما هي أشجار الخشب الأحمر الموجودة بولاية كاليفورنيا . وتطلق على أضخم أشجاره اسماء مشاهير العظماء . ويبلغ ارتفاع شجرة الجنرال شيرمان ٨٣ مترا (٢٧٢ قدم) ومحيطها ٣٠ مترا (١٠١ قدم) عند قاعدة الجذع .



كيف تذهب المبادرات

يصنف علماء النباتات دراستها علمياً . وفي الصفحة المقابلة يجد القارئ الأقسام السبعة الرئيسية منها :

أو الشكل ، تماماً مثل وموتك .

ويطلق على هذه المجموعة المتشابهة من النباتات لفظ « نوع » ، وتسمى باللاتينية *Rosa canina* التي تعني ورد الكلب .


وتجمع الأنواع المتشابهة معاً لتكون مجموعات تسمى أجنسا *genera* كذلك تجمع الأجناس المتشابهة في فصائل *families* ، والفصائل في طوائف *classes* ، ويستمر هذا التقسيم حتى نصل إلى الأقسام *divisions* السبعة الرئيسية الموضحة على الصفحة المقابلة .

وتكتب الأسماء العلمية اللاتينية بعرف مائة فيكتب الاسم *Rosa canina* ولا يكتب *Rosa canina* أما الأسماء العادية (غير العلمية) فتكتب بالمرور العادي .

تصنيف النباتات :

توجد عدة طرز مختلفة من النباتات كما هو مبين بالصفحة المقابلة . ولدراستها علمياً يضطر علماء النبات إلى ترتيبها ، أي تسميتها وترتيبها ترتيباً متسلسلاً . ولعمل ذلك يقومون بفحص النباتات بعناية ومضاهاتها بعضها . وتجمع النباتات المتشابهة مع بعضها ، أما المتباعدة فتوضع في مجاميع متفصلة . وتركيب الزهرة عامل هام في تصنيف النباتات .

والوحدة الأساسية في هذا التصنيف هي النوع *species* ، وستجد على الصفحة المقابلة صورة لزهرة الورد البري ، وهو نبات ينمو برياً في بريطانيا . ونباتات الورد البري كلها متشابهة ، غير أن كل نبات قد يختلف عن الآخر اختلافاً بسيطاً في المجم




كان كارل فون لينيه عالماً نباتياً سويدياً . وقد اوجد سنة ١٧٥٣ طريقة لتصنيف النباتات وذلك باعطائها اسماء لاتينية ثنائية ، وقد استخدم اللاتينية لكونها لغة عالمية . وثنائية تعنى اسمين . والانسان يطلق عليها عادة اسمان على الاقل ، ويكون الأول منها هو اسم الفرد والثاني اسم العائلة . وبنفس الطريقة تطلق الأسماء على النباتات والحيوانات . وقد أصبح كارل فون لينيه مشهوراً لنا باسم لينياس *Linnaeus*

فصيلة السذاب



ثمار الموالح



قد تبدو الثمار المرسومة على هذه الصفحة كثيرة الاختلاف فيما بينها ، الا انها تشتراك كلها في عدة صفات ، فمثلاً تتمتع كلها بطعم حاد وقشرة سميكة وثمرة مقصبة . كذلك فإن أوراق وازهار نباتها قريبة الشبه بعضها . لذلك فمن السهل معرفة السبب الذي من أجله اطلق على كل منها اسماء خاصـاً وأطلق على مجـموعـها كلـ اسـم ثـمـارـ سـيـتروـس *Citrus* للتشـابـهـ بينـهاـ . واسمـ المـجـمـوعـ هو اسـمـ الجنس *Genus* . وبنفس الطريقة التي جمعـتـ بهاـ النـباتـاتـ المـشـابـهـ بـدرـجـةـ كـافـيـةـ فيـ جـنـسـ واحدـ ، تـجـمـعـ عـدـةـ أـجـنـاسـ مـشـابـهـ فيـ مـجـمـوعـةـ تـسـمـ فـصـيـلةـ *Family* . والنـباتـاتـ المـوـضـعـةـ عـلـيـهـ يـمـيـنـ هـذـهـ الصـفـحـةـ كـلـهـاـ اـفـرـادـ مـنـ فـصـيـلةـ السـذـابـ .



٣ - بقية الطحالب الأخرى :

تكون بقية الطحالب الأخرى قسمًا ثالثاً . وهي تنمو في عدة أشكال والوان . وأكبر نباتاتها ما نسميه بالأعشاب البحرية . ومن الممكن أن يكون لونها أخضر أو بنياً أو أحمر . ومن الأعشاب البحرية ما يصل طوله إلى ٦٠ متراً (٢٠٠ قدم) . كذلك توجد طحالب دقيقة تعرف بالدياتومات . ويعيش أغلب الطحالب في الماء ، أو في الأماكن الرطبة .




٤ - السراغن :

والسراغن صنف آخر من النباتات التي لا تنتج أزهاراً أو بذوراً . وعلى التقىض من العزازيات نجد أن النبات الأم ينتج أبواغاً أولاً . ويسقط كل بوج على الأرض وينمو ليكون نباتاً صغيراً يعرف بالثالوس الأولى الذي ينتج بدوره أجزاءً مذكورة وأخرى مؤنثة تتحد مع بعضها لتكون الجنين . وينمو الجنين بعد ذلك ليكون نباتاً سراغن جديداً .



لذا فهي قادرة على تكوين أوراق معقدة الأشكال . أما القسم الآخر من مقطة البذور فيعرف بذوات الفلقة الواحدة . والسبب في هذه التسمية هو أن النبات الجنيني الموجود بالبذرة له ورقة بدورية ، أو فلقة ، واحدة . والأجزاء الزهرية فيها مرتبة في مجموعات من ثلاثة أو مجموعات لها .



٢ - الطحالب الزرق - خضراء :

وهي تشمل مجموعة من الطحالب البسيطة جداً ، ويتألف بعضها من خلية واحدة ، إلا أن البعض الآخر يتصل ببعضه على شكل عقد من الخلايا تسمى خيوطاً . وتعيش الطحالب الزرق - خضراء في الماء والتربة الرطبة ، وإذا كثر عددها فإنها تبدو كطبقة من المخاط الأخضر . وهي تجهز غذاءها بنفسها وتتكاثر كالبكتيريا .




٥ - العزازيات :

تعرف النباتات العزازية الزاحفة والعزازية القائمة باسم العزازيات . وهي نباتات لا تتکاثر بالبذور وإنما تتکاثر بأن ينبع النبات الأم أجزاءً مذكورة وأخرى مؤنثة تسمى الأمشاج (جاميات) ، وهي تكون الجنين باندماجهما معاً . وينمو الجنين على نبات العزاز القائم أو الزاحف حتى يصبح قادرًا على إنتاج الأبواغ . تسقط الأبواغ بعد ذلك على الأرض وتنمو لتعطي نباتات جديدة .



التي تزهر وتنتج بذوراً ملقاة عليها بالنباتات مقطة البذور . وتنقسم مقطة البذور إلى قسمين ، أولهما ذوات الفلقتين التي ينمو جنينها من البذرة وله ورقتان بذرية أو فلقتان . وعندما يكبر النبات ينتج أوراقاً ذات عروق تنتشر على هيكل شبكة . ولما كانت العروق تتفرع بهذا الشكل



١ - البكتيريا :

البكتيريا واحدة من أصغر الكائنات الحية ومعظمها تتالف من خلية واحدة لا يمكن رؤيتها إلا بマイكروسکوب . وهي تتکاثر بانقسام جسدها إلى قسمين . وببعضها سريع الانقسام إلى درجة أن العملية تتم كل ٢٠ دقيقة . وببعض الأنواع تجهز غذاءها بنفسها ، إلا أن الكثير منها يعيش على نباتات وحيوانات أخرى .



٤ - الفطريات :

عندما ننظر إلى فطر عيش القراب فانك في الواقع لا ترى غير الجزر ، المشر ، أي المنتج للأبوااغ ، من الفطر . ويتألف الجزر ، الأساس من الفطر من خيوط دقيقة تسمى الغزل الفطري . ونحن عادة لا نلحظ هذه الخيوط لأنها تنمو تحت الأرض أو داخل نباتات أخرى . وأغلب الفطريات عاجزة عن تجهيز غذائها ولذا تعيش ، تعويضاً لذلك ، على نباتات أو حيوانات أخرى .



٧ - النباتات البذرية :

النباتات المغروطية نباتات خشبية زهرية تتکاثر بالبذور . وهي تنتمي إلى مجموعة النباتات البذرية . وتختلف أزهار المغروطيات عن أزهار معظم النباتات الزهرية في أنها عديمة البتلات . كذلك تكون بذور المغروطيات عارية ، وهذا معناه أن البذور لا تتكون داخل ثمرة . وتسمى النباتات


الأماكن التي تعيش فيها النباتات

لقد تكيفت النباتات مع كثير من الظروف حتى لم تبق سوى أماكن قليلة بدون نباتات .

نهاراً وشديدة البرودة ليلاً . وعلى النباتات الصحراوية أن تحمل هذه التغيرات في درجة الحرارة بالإضافة إلى نقص الماء . وفي الصفحة المقابلة بعض الوسائل التي تمكنت النباتات الصحراوية بواسطتها من التكيف مع بيئتها .

وتوضح الصورة الكبيرة أسفل هذا الكلام جيلاً نموذجياً في غينيا الجديدة ، وهو عبارة عن جزيرة قريبة من خط الاستواء . والجو شديد الحرارة عند

سفح الجبل . شديد البرودة عند قمته . وعندما نسلق الجبل صاعدين فإننا نمر بتغيرات في حياة النبات تشبه تلك التي نمر بها عندما نسافر من خط الاستواء إلى أي من القطبين .



البقاء :
تنمو النباتات منتشرة على البسيطة كلها وتعيش في أماكن متعددة مختلفة . وقد يكون مسكنها رطباً أو جافاً ، حاراً أو بارداً ، كما تتأثر بتغير الفصول . كذلك قد تتبادر أنواع التربة التي تعيش فيها . فقد تكون التربة ، مثلاً ، رملية أو جرية صخرية أو طينية .


وبعض النباتات لا تعيش في التربة إطلاقاً بل تقضي معظم حياتها في الماء . ولما كانت النباتات المائية محاطة بالماء ، لذا فهي ليست في حاجة إلى البحث عن الماء بجذورها ، وهي لذلك لا تحتاج إلا إلى قليل من الجذور للثبت . وتكون الأوراق المغمورة في الماء رقيقة ناعمة لأنها تحتاج إلى سطح متسع لامتصاص الغازات من الماء .

وعلى العكس من النباتات المائية نجد أن بعض النباتات تتمكن من البقاء دون كثير من الماء ، وهذه هي نباتات الصحراء . وتتراوح درجة الحرارة في معظم الصحراء ما بين شديدة الارتفاع



النباتات المائية :


يعيش نبات شقيق النعمان المائي في الماء ، وهو لا يحتاج إلى قوة في الساق أو الأوراق لأن الماء يعطيه دعامة . والنبات له نوعان من الأوراق . فالاوراق المغمورة في الماء تكون رقيقة ومقسمة إلى أجزاء دقيقة . أما الأوراق الطافية فتكون أكثر سمكاً وقدرة على تحمل جفاف سطحها بفعل الشمس والرياح .



تنمو أشجار الغابات الاستوائية المطرة طويلاً ورقيقة . وعادة ما تنمو لها دعامات كبيرة عند قاعدتها لزيادة دعامتها .

· أخِيَّةٌ فِي الصُّحُورِ ·



النباتات التي تعيش في الصحاري عليها أن تقضي فترات طويلة بدون ماء، في درجات حرارة عالية أو منخفضة .



يمكن للشجيرات أن تحمي النبات بنفس الطريقة التي تحمي بها الحيوان من الحرارة الشديدة الارتفاع أو الانخفاض . وهي أيضاً قادرة على التقليل من فقد الماء .


بعض النباتات الصحراوية لها أوراق صغيرة سميكه ذات سطح شمعي حتى لا يتغير من مانها سوى التزوير . وتعتمق جذورها كثيراً في التربة بعيداً عن الماء .

سيقان التين الشوكي مفلطحة خضراء لأنها تخزن الغذا، والماء . ولا توجد أوراق حقيقية على هذا النبات .



تنخفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا فوق سطح الأرض . وهنا تنمو أشجار دائمة الخضرة وأخرى نفضية صغيرة . والمكان دافئ يعمر كثيراً من العوازيز والمراسي .

أكثر من 1500 متر (5000 قدم) حيث تفصح الأشجار مكاناً لنباتات الراعي الدائمة المعتدلة . وتوجد نباتات الفار الجميلة على هذا الارتفاع .




جودة إلى الغابة الاستوائية المدارية الرطبة المطرة


أكثر من 2600 متر (8500 قدم) حيث توجد بعضاً من الأشجار كدعامة لنباتات أخرى مثل بياتات الجنبيان الآلي . وهي تشبه الجنبيان الذي ينموا في شمال أوروبا . ويصل ارتفاع بعض جبال غينيا الجديدة إلى ارتفاع 4900 متر (16000 قدم) . وقد يوجد الجليد أحياناً على هذا الارتفاع .

أجزاء النباتات

الأجزاء الرئيسية للنباتات الراقية هي الأوراق والسيقان والجذور .
هذه الرسوم مكبره .



الجزء الرئيسي لبادرة شجرة التين الجبل وقد بدأ فعلا في التفرع لتكوين الجذور الثانوية .
وستمر الجذور في التفرع حتى تجاري احتياجات المجموع النضرى المطرد النمو . وينمو السويق الرئيسي ليصبح في النهاية جذع الشجرة .
والبراعم الموجودة في أباط الأوراق تنمو لتشعو
في المستقبل إلى أشجار .




الخلايا النباتية مصنوعة من مادة تسمى البروتوبلازم . وكل خلية نواة تسيطر على كثير من وظائفها . وجدران الخلايا مصنوعة من السليولوز ، أما المادة الخضراء التي تسمى الكلوروفيل ، والتي توجد داخل الخلايا ، فتتوجد داخل أجسام صغيرة تسمى البلاستيدات الخضراء .




كيفية بناء الورقة :

ترتبط النباتات او رايتها على الساقان بحيث تقتصر كل ورقة الكمية المناسبة من ضوء الشمس . ولتفادي الجفاف بفعل الشمس ، تقطع كل ورقة بطبقة خارجية متينة تعرف بالطبقة الكيويثينية . وتخرج الاوراق الماء الزائد وتسمح بتبادل الغازات خلال فتحات دقيقة في سطحها السفلي تعرف باسم الشغور . وتتصل الشغور بمسافات الهوائية الموجودة بين الخلايا . وتغير الخلايا العارضة التي تمد الشغور من شكلها كى تفتح الشغور او تغلقه ، وبهذه الطريقة يمكن لاي نبات ان يتحكم في تبادل الغازات والماء .




التركيب الداخلى للساق :

توجد داخل ساق النبات حلقة من العروق الراسية تسمى الحزم الوعائية ، وهي تنقل الماء والأملاح المعدنية من الجذور الى الأوراق ، كما تنقل بالتالي الغذاء المجهز في الأوراق الى باقي أجزاء النبات . كذلك فان هذه الحزم تعطى دعامة للنبات . والترتيب الاسطوانى للحزم هو افضل ما يكون لسيقان النباتات لأنها تمكنها من مقاومة قوة الرياح .



عروق (نسيج وعائى)



بناء من الخلايا :

مختلفاً من الخلايا . وتعمل ملايين الخلايا التي توجد في النبات الرأقي كلها معاً بتوافق يجعل منها كائناً حياً على الكفاءة .

والاجزاء الثلاثة الهامة في النباتات الرأقية هي الجذور والسيقان والأوراق . والجذور تبحث عن الماء والأملاح المعدنية في التربة وتوصلها إلى السيقان . وهي أيضاً أداة لتشبيط النبات . والغصن الرئيسي للنبات هو الساق الذي ينقل الماء والأملاح المعدنية إلى الأوراق كما يحمل الأوراق والأزهار . وقد تستخدم السيقان أو الجذور في احتزان الغذاء . كذلك تقوم الأوراق بانتاج الغذاء . وأغلب الأجزاء النباتية الأخرى نشأت من هذه الأجزاء الثلاثة ، فالازهار ، منلا ، نشأت من الأوراق .

جميع أجزاء النبات مصنوعة من خلايا ، وأغلب الخلايا دقيقة الحجم بحيث لا يمكن رؤيتها إلا بالميكروسكوب . وتحتوي كل خلية على مواد كيماوية تحدد نوع الخلية في مستقبل حياتها ونوع العمل الذي تؤديه ، فبعضها ، مثلاً ، سيقوم بنقل الماء بينما يخزن غيرها الغذاء .

وبعض النباتات له أعضاء أكثر من البعض الآخر ، فالنباتات البسيطة ، أو الدينية ، كالطحالب لها أجزاء قليلة جداً . فهي ، مثلاً ، ليست لها جذور أو أزهار وبذراً فخلاياها قليلة الأنواع . أما النباتات الأكثر تعقيداً ، أو الأرقى ، فلها جذور وسيقان وأوراق ، وهي مكونة من سبعين إلى ثمانين نوعاً

التركيب الداخلى للجذر :

تكون العروق التي تعرف بالنسيج الوعائى الجذر ، المركزي من الجذور ، ويحصل النسيج الوعائى للجذر بالنسيج الوعائى للساق . ويأخذ الجذر الماء بواسطة شعيرات دقيقة . ولا تعيش هذه الشعيرات طويلاً ، بل تموت وتخل محلها شعيرات جديدة تنمو باطراد أعلى قمة الجذر النامية مباشرة .

التلقيح

الأزهار هي الأعضاء الجنسية في النباتات البذرية


انتاج البذور :

تتكاثر النباتات الزهرية بانتاج البذور ، وهي عملية هامة تقوم بها الأزهار . والنباتات تتكاثر جنسيا ، وهذا يعني اتحاد جزء « مذكر » من الزهرة مع جزء « مؤنث » منها . وبعض النباتات تحمل الأجزاء المذكورة والمؤنثة معاً في كل زهرة ، وهذا هو النوع الذي سنتناوله كمثال .


والجزء المذكر من الزهرة هو السداة ، وهذه لها حامل طويل يسمى الحبيط . ويوجد عند قمة الحبيط المتنك الذي ينبع حبوب اللقاح . ويتالف الجزء المؤنث من البوصبة التي توجد داخل البيض . وتندو المدققة من البيض إلى أعلى ، وهي تتكون من حامل طويل يدعى القلم ، وينتهي بجسم كروي لزج يعرف بالميس .

ولكي يتم التلقيح يجب أن تستقر حبة لقاح على ميس الزهرة . وقد تعجب وتتسائل عن سبب وجود بتلات في الزهرة . إنها تقوم بحماية الأجزاء المذكورة والمؤنثة من الزهرة كما تلعب أيضا دورا هاما في اتمام عملية التلقيح ففي النباتات التي تستخدم الرياح في نشر اللقاح على الميس تكون بتلات الزهرة صغيرة حتى تسمح للقاح بسهولة الانتقال . أما النباتات التي تعتمد على الحشرات في نقل اللقاح فتتكون بتلاتها عادة أكبر حجما زاهية الألوان عطرة الرائحة حتى تجذب إليها الحشرات .

مقطع طولي في زهرة المانوليا



لقد كان نبات المانوليا من أول النباتات التي انتجت أزهارا بتلية (ذات بتلات) . وتوجد الأجزاء المذكورة والمؤنثة في كل زهرة ، والتلقيح يتم بواسطة الحشرات . وتوجد البذور مصونة داخل البيض حتى تصبح صالحة للنمو وتكوين نباتات جديدة .



الهندباء البرية لها زهرة أكثر تعقيدا من زهرة المانوليا . والرأس الزهرية في الواقع عبارة عن مجموعة من الأزهار الصغيرة او الزهيرات . وتلتجم بتلات كل زهرة لتكون انبوباً تنمو في داخله الأجزاء المذكورة والمؤنثة .



تتعلق أشجار المخروطيات بواسطة الهواء فتنتج كميات كبيرة من اللقاح لأن الكثير منها يفسيع ولا يصل إلى الزهرة المؤنثة . وهذا هو السبب في ظهور غبار أصفر من حبوب اللقاح في غابات الصنوبر في الربيع .

التلقيح بواسطة الرياح والخشرات




أزهار

تنتج بعض الأشجار التي تتلقى بمساعدة الرياح ، مثل نبات الحوره ، ازهارا قبل ان تتفتح الأوراق في الربيع ، مما يسهل وصول حبوب اللقاح الى الأزهار المؤنثة قبل ان تعرضها الأوراق .



وتزور الخشرات الأزهار لتهمل من رحيقها الذى هو عبارة عن سائل سكري يوجد عند قواعد البلاطات . وعندما تلتج الخشرات داخل الأزهار كى تصل الى الرحيق ينتشر اللقاح من المتك على جسمها . وعندما تزور الخشنة زهرة اخرى يسقط بعض ما التصق بها من لقاح على سطح الميس المترسج .



اللقاء



إذا نظرنا الى حبة اللقاء هذه ، التي أخذت من نبات يتلقى بواسطة الخشرات ، فاننا نجد لها ذات اشواك دقيقة . أما النباتات المخروطية فتلقي بواسطة الهواء . وحبوب اللقاء لها اكياس هوائية تساعدها على الانتقال بالهواء .



تلقي بعض النباتات بواسطة الهواء بطرق غير اعتيادية ، فيتم التلقي في اوركيد انجريس الذي يعيش في جزر ملاجاس ، مثلا ، بواسطة فراشة ذات لسان طويل جدا . وتعتاج الفراشة الى هذا اللسان الطويل كى تصل الى رحيق الاوركيد الذى يوجد في قاع انبوب يصل طوله الى ٣٠ سنتيمترا (١ قدم) يسمى المهماز . ويبين الرسم الفراشة وقد لفت لسانها حول نفسه .

مهماز



تلقي زهرة الجيفة بواسطة الذباب . ولكن تجذب الزهرة الذباب بعد تونها لون اللحم الفاسد ورائحتها نتنة .

تلقي شجرة الباوباب عادة بواسطة الخفافيش التي تشرب الرحيق من ازهارها ليلا . كذلك يجذب الرحيق السنابس الصغيرة فيساعد في تلقيح الأزهار

انتشار البذور

يجب على البذور أن تنتشر قبل أن تنبت لتكون نباتات جديدة .

عند نضجها فتطلق البذور بعيدا .

والنباتات التي تعيش في الماء


أو قريبا منها عادة ما تسقط بذورها بشكل يمكنها من الطفو على سطح الماء والانتقال مع تياره بحثاً عن مسكن جديد لها . كذلك تساعد الحيوانات في انتشار البذور . فإذا أكل حيوان أحدي الشمار فإن البذور التي يدخلها لا تهضم وتمر سليمة في القناة الهضمية للحيوان حتى تخرج في النهاية ويلقى بها على الأرض مع برازه .

كذلك فإن بعض البذور لها شعرات لزجة أو خطافات عمل البراشوت فتنتقل البذرة مسافة كبيرة قبل أن تستقر على الأرض . وهناك نباتات أخرى تتناثر بذورها داخل قرنات تتفجر تسقط عنه في مكان آخر


تروحال البذور :

بعد تلقيح الزهرة يجب أن تتم فيها عملية التلقيح حتى تكون البذور . كما يتضح من الشكل المبين بجوار هذا الكلام . والقصة لا تنتهي عند تكوين البذور . ولكن تنمو البذرة إلى نبات جديد عليها أن تفارق النبات الأم لتجد مكاناً ملائماً تنبت فيه . وتستخدم النباتات وسائل متعددة لنشر بذورها .


وبعض النباتات ، كالهندباء وذنب القط ، لها شعرات صغيرة على البذور . وتعمل هذه الشعرات عمل البراشوت فتنتقل البذرة مسافة كبيرة قبل أن تستقر على الأرض . وهناك نباتات أخرى تتناثر بذورها داخل قرنات تتفجر



كما سبق أن دأينا ، لابد لإتمام التلقيح أن تستقر جبة اللقاح على ميس الزهرة . فإذا كان اللقاح وليس من نفس سلالة النبات فإن جبة اللقاح ينمو منها أنبوب يتجه رأساً إلى أسفل مخترقاً القلم حتى يصل إلى البيض . بعد ذلك يتعدد الجزر المذكور في جبة اللقاح مع الجزر المؤنث الموجود داخل البويفسة فتنتفخ البذرة . وتعرف هذه العملية بالأخشاب . وبعد الأخشاب تذوي بتلات الزهرة وتسقط لعدم الحاجة إليها بعد ذلك .




زهرة الفراولة لها مبايض كثيرة بدلاً من واحد فقط . ولكن من هذه المبايض بويفسة وقلم وميس . ويعطي كل مبيض مخصب بذرة . وبدلًا من أن تطرد كل بذرة ثمرة مستقلة ، تنمو بذور كل الزهرة مما تُعطي ثمرة واحدة وينتفخ التحت تعت البذور النامية .



زهرة التفاح لها مبيض واحد يحتوى على عدة بويفسات . وعندما يخصب المبيض تتحول كل بويفسة إلى بذرة وينتفخ التحت ويحيط بالبيض مكوناً الثمرة التي نأكلها .

الانتشار عن طريق الريح

من أكثر الوسائل شيوعا في انتشار البذور ، الرياح . ونبات لحية العجوز نبات متسلق ينمو في سياج الشجيرات ، تطير بدوره في الهواء حتى تصطدم بشجرة فتسقط على الأرض . وأشجار الدلب والزدادار لها بذور تطير من الأشجار في خطوط لولبية حتى تستقر على الأرض . أما الحشخاشة فتشبه القدر ، وعندما تهب الريح تنتشر البذور خارجا خلال ثقوب في علبة الثمرة .



الانفجار :

تفجر بعض العلبة الثمرة لتحرر البذور . ففي نهاية الصيف تشق ثمار نبات الأبنوس الكاذب وتتفتح لتنشر البذور . وإذا ضغطت على ثمرة القثاء البرية فإن بدورها تنساب من أحد طرفيها ومعها سائل خاص .



الانتشار بواسطة الماء

القرع الطويل



القرع الطويل يمكنه أن ينشر بذوره بواسطة الماء . وجلد الثمرة الجافة عبارة عن علبة خشبية لا تنفذ الماء وتطفو على سطح الماء بكل سهولة .

معونة من الحيوانات :


الحيوانات وسيلة هامة في الانتشار . يدفن السنديان ثمار البلوط في أخريف ليتغذى عليها في الشتاء ولكن ينسى بعضها عادة لكنه تعطي أشجار بلوط بعد ذلك . بدور نبات الحطاف بعنوب إفريقيا لها حطافات تشتكي بها الحيوانات وبذلك ينقلها الحيوان . بعض التamar تأكلها الطيور ، وتمر بذورها في جسم الطائر حتى تخرج مع برازه دون أن تتأثر .



الانبات

تحتاج البذور الى ظروف ملائمة قبل الانبات .

يبدأ الانبات في بذرة البلوط عندما تتعفن البذرة الماء وتنتفخ فينشق غلافها ويبرز الجذر الابتدائي (الجذير) ثم ينمو الساق إلى أعلى . وتحتوي البذرة على غذاء لتغذية البادرة إلى أن تكون أولى الأوراق .



منظمات كيماوية :

تحتاج كثير من البذور إلى فترة كمون حتى تتوافر الظروف الملائمة للانبات . والجنبين هو جزء البذرة الذي ينمو ليكون النبات الجديد . وهو مزود بمخزن للغذاء داخل البذرة ويحميه غلاف البذرة الخارجي . وقبل أن ينبع الجنبين يجب أن يتوافر قدر مناسب من الحرارة

والرطوبة ، ويختلف هذا القدر باختلاف النبات .

وتوجد داخل كل بذرة منظمات تمنع الانبات حتى تتوافر الظروف الملائمة ، فمثلا ، لا تنبت بذور المناطق الباردة إلا عندما يحل دفء الربيع . أما في الصحاري فلا تنبت البذور إلا إذا أغرقتها مياه الأمطار .



يسعى جبل الأجاج الذي يضاف إليه كل الغذاء الذي تحتاجه البادرة . وتنبت البذرة لتكون كرة صغيرة تدعى الكورمة الأولية التي ينمو منها الجذر والورقة الأوليين . بعد ذلك يؤخذ نبات الأوركيد من العجل ويزرع في أصيص .

بذور الأوركيد صغيرة جدا . وقد تحتوي الثمرة الواحدة على ثلاثة ملايين بذرة . ويساعد على نبات بذرة الأوركيد ونموها بعض الفطريات التي تعيش في الجذور . والأوركيد والفطر يمد كلاً منها الآخر بالغذاء . وبذور الأوركيد صعبة في نموها ولذا يستعمل مربو النباتات طريقة خاصة لذلك ، البادرات على نوع من العجل


الوراثة والتغيير

تنشأ بالطبيعة اشكال نباتية جديدة ، غير ان الانسان قد تعلم كيف يتحكم في عملية التغير .

اشكال جديدة :

جديدة بالطبيعة يعني ان نباتات عديدة

ان النوع الجديد من النبات اما ان تمكنت من التكيف مع ما يحيط بها ينشأ بالطبيعة واما بعملية تهجين ولم تتم . ويمكن للانسان استحداث خاصة . وعندما يتم الاصناف بين نبات سلالات نباتية جديدة بانتخاب أفضل واخر مختلف ، ولكن من أقربائه ، فان الانواع للزراعة ، فالفلاح مثلا لا يزرع البذرة الناتجة تعطي أحيانا نباتا جديدا الا النباتات التي تعطي أكبر الشمار يطلق عليه اسم هجين . وانتاج نباتات وأوفر المحاصيل .



كان جريجور يوهان مندل قسسا مفتونا بالنباتات . وفيما بين عامي ١٨٥٧ و ١٨٦٤ قام باجراء عملية تلقيح خلط بين سلالات مختلفة من البازلاء . وقد ادى عمله حجر الأساس لدراسة علم الوراثة ، وهو عبارة عن الطريقة التي تنتقل بها الصفات من جيل الى جيل .

ترث النباتات الصفات من الآبوبين . يوجد في هذا المثال نباتان من نباتات حنك السبع احداهما احمر والآخر ابيض انتجا عند تهجينهما نباتا وردي اللون ، وهو لون ينتج عند امتصاص اللونين الاحمر والأبيض ، وهما لونا الآبوبين . واذا تلقيح النبات الوردي بنبات آخر وردي اللون مثله تتعزز الصفات ، الاحمر والأبيض ، مرة اخرى وتنتج نباتات حمراء وآخرى بيضاء .


الذرة :

محصول الذرة من المحاصيل الهامة في كثير من بلاد العالم . وقد زرعته في الولايات المتحدة بعض قبائل الهند منذ آلاف السنين . وقد كانت اول ذرة عرفت في الزراعة ، وهي الآن بائدة ، اقرب شبه بالقمح . اما الذرة الحالية فقد هيمنها الفلاحون ، عبر القرون ، الذين كانوا يهجنون الانواع ذات العجوب الكبيرة . كذلك هيمنوا الذرة مع الريانة والتريساكم . اما ذرة الششار ، التي تعالج بالحرارة حتى تنفجر منتجة . الششار ، لعلها صفات الذرة البدائية الأصلية . وذرة ناب الجمل هي الان المحصول الرئيسي للذرة في الولايات المتحدة .



كيف تنمو النباتات

تستمر النباتات في النمو طيلة حياتها .



تنمو جذور النبات عادةً إلى أسفل نحو القلام والماء . بينما تنمو الساق صاعدةً إلى أعلى نحو الضوء . وبفضل النبات ذلك كي يصل إلى الماء والغذاء الموجودين في أسفل التربة وللحصول على ضوء الشمس الذي يمتهن الطاقة . وإذا وضعت بذرة في أنبوبة ذات جو رطب بحيث يسقط الضوء عليها من أعلى فإنك تشاهد جذورها متوجهة إلى أسفل والساق إلى أعلى .



قبل أن يتفتح بُرْعَم في شجرة كستنا، الحصان تكون الأوراق العديدة قد تم تكوينها . وعند حلول الربيع يتفتح البرعم نتيجة صعود الصارة في الساق وتبدأ الأوراق داخل البرغم في الظهور شيئاً فشيئاً . وبعد ذلك تستطع العرائش الخارجية ثم تنمو الأوراق الصغيرة ببطء .



على حمل الأزهار والثمار والأوراق النامية يجب تقويتها وزيادتها في السمك وتعرف عملية زيادة السمك بالتلظلل الثانوي .

وسقيقان أشجار النخيل لا يحدث فيها تلظلل ثانوي . وهي رغم أنها تزداد في الارتفاع وتنتج أوراقاً جديدة كل سنة فإن أوراقها القديمة أما أنها تذوي أو تسقط كلية حتى أن عدد الأوراق يبقى دائماً ثابتاً تقريباً ، الأمر الذي يجعل الساق خطر الانضغاط . والضغط الذي يحدثه الساق أو الجذر أثناء نموه ضغط هائل ، فورقة الموز الضعيفة المظهر قادرة على اختراق سقف بيت زجاجي ، كما يمكن جذور شجرة صنوبر أن تشق قطعاً من الصلب سمكها ١ سم (٤٤ بوصة) .


وتنمو الأوراق والبراعم والأزهار في نبات ما طبقاً لطراز خاص ، فتنمو الأوراق بحيث تحصل كل ورقة على بعض الضوء . وإذا جرح نبات فإن جروحه تلتئم . والنباتات بصفة عامة تختلف عن الحيوانات في أنها قادرة على تعويض الأجزاء التي تفقد منها .



طرق النمو


تستمر النباتات في زيادة الحجم طيلة حياتها بينما نجد حجم الحيوانات محدوداً . وأطراف الساق والجذر هي الأماكن التي يبلغ النمو فيها أقصاه ، مما يؤمن صعود الساق والأوراق إلى الضوء وتغلل الجذر وانتشاره جانبياً في التربة .

والنباتات البسيطة ، كالطحالب ، تزيد من عدد خلاياها وتشتهر في مساحة أكبر من الماء . وبعض الأشجار ، مثل كستنا الحصان ، تزداد في الحجم بطريقة أكثر تعقيداً . فلكل يقوى الساق



حلقات النمو :

يمكن رؤية حلقات النمو في ساقان وأغصان النباتات الخشبية . في المناطق المعتدلة تبين هذه الحلقات سنوات النمو ، وبحساب عدد حلقات النمو يمكن معرفة عمر شجرة تكون قد نمت في المنطقة المعتدلة .



كاس العجر

زنبق ما ، الأمازون الضخم يمكنه تكوين أوراق ضخمة يزيد قطرها عن المترين ، وتدعمها فوق سطح الماء عروق قوية في سطحها السفل . ويبلغ النبات هذا الحجم في سنة واحدة . والبدرة في حجم بذرة البازلاء ، أما الورقة الأولى صغيرة جدا بينما تكون الأوراق التالية أكبر فاكبوا وهكذا حتى تسلم العجم الكامل .



زنبق ما ، الأمازون



خيزران عملاق

اذا نظرت الى اوراق كاس العجر من اعلى لامتنك ان ترى بسهولة ان اوراقه تتبع طرازا منتظما يتبع لكل ورقة بعض الفصوص .

وفي بعض النباتات تنمو الاوراق في ازواج على جانبي مقابلين من الساق . وتنمو في نباتات اخرى في ترتيب حلزوني .

ينمو الخيزران العملاق (باميو) بسرعة كبيرة ، فقد ينمو النبات حوالي ٣٠ متر (٩٨ قدم) في السنة الواحدة . وهي قادرة على هذا النمو السريع لأن المناطق الحارة تعطي النبات الكثير من الدفء والغذاء اللازمين لهذا النمو .



طُرُقٌ أَخْرَى لِلتَّكَاثُر

تنتج بعض النباتات نباتاً جديداً من جزء من الجذر أو الساق أو الأوراق .



ينتشر النجيل بسرعة بزراعة قطع من ساقه الأرضية التي تشبه الأسلاك . وتعرف هذه السيقان الأرضية بالريزومات فإذا ترك جزء من الريزوم في الأرض بعد حرثها فإنه يعطي نباتاً جديداً .




يعطي بعض النباتات ، مثل كرات بيت العنكبوت ، سيقاناً طويلة تسمى السيقان الجارية . ومن اطراف هذه السيقان تكون نباتات جديدة صغيرة تكبر بعد ذلك وتكرر العملية .



داخل البصلة :


تتكون بصلة النرجس البري من ساق منشفطة وأوراق . وبين طبقات البصلة يكون النبات بصيلات بنوية تنمو بعد ذلك إلى نباتات جديدة .



كورمة الزعفران عبارة عن ساق متعددة . وفي كل سنة تكون كورمة جديدة يختزن النبات غذاء فيها . كذلك ينتج كل نبات كورمات إضافية كل عام من البراعم الجانية ، وهذه الكورمات الجديدة تعطي نباتات جديدة .



تنتج بعض أنواع الصبار نباتات تخرج من الساق الرئيسية تعرف باسم العلمات . وهذه يمكن فصلها بسهولة من النبات الرئيسي وإذا سقطت على الأرض فإنها تكون جذوراً وتنمو .




كل حبة بطاطس عبارة عن درنة أو ساق اورغية متضخمة . وتنمو الدرنة في الصيف لتكون نباتاً جديداً ، أما السيقان الجانية فت تكون درنات جديدة بينما تنكمش الدرنة القديمة تدريجياً .

التكاثر

يمكن لاغلب النباتات أن تتكاثر جنسياً ، وتم هذه العملية عندما تندمج الخلايا الذكرية التي ينتجهما النبات مع الأعضاء الأنوثية . الا أن كثيراً من النباتات يمكنها أن تتكاثر خضررياً بالإضافة إلى ذلك . والتكاثر الخضرى معناه أن النبات قد يعطى نباتاً جديداً من جزء من الجذر أو الساق أو الورقة العاديه .

ويستغل البستانيون التكاثر الخضرى في الحصول على نباتات جديدة بسهولة وسرعة ، فهم يأخذون قطعاً من النباتات ويحتفظون بها حية حتى تتكون لها الأجزاء التي تنقصها وتصبح نباتات كاملة . وتكون كل النباتات التي تتكون من أب واحد ، بهذه الطريقة ، متشابهة فيما بينها تمام الشبه .


والتطعيم طريقة أخرى للحصول على نباتات جديدة ، فهو وسيلة للتکاثر اخترعها الإنسان ، مؤداها ربط ساق نبات على جذر نبات آخر . وهناك أسباب كثيرة لعمل ذلك . ففي المقام الأول ، قد يستحيل الاكتثار من سلالة ممتازة لنبات ما بالطرق الأخرى فيقوم الإنسان بتطعيمها على نبتة صغيرة لنبات من أقربائه . كذلك فإن النبات الذي يستخدم جذرها في هذه العملية قد يساعد في مقاومة المرض أو التحكم في حجم النبات المركب . الواقع أن عملية ربط جذري النبات مما تحتاج إلى مهارة إذ يلزم أن تتقابل خلايا النمو النشط . كالكمبيوم ، مع بعضها .



نبات بازلا ، الصعرا ، الاسترالية تصعب زراعته في أوروبا الا انه يمكن زراعته بالطريقة الفريدة التالية : قطع جذور البادرة الصغيرة لهذا النبات وقطع على ساق وجذور بادرة نبات الكاسية الذي ينمو في حوض البحر الأبيض المتوسط . بهذه الطريقة ينمو النباتان معاً وينتج منهما نبات بازلا صعراوى ذو جذور من نبات الكاسية .

طرق التغذية

هناك عدة طرق مختلفة لتغذية النباتات



الفناء من مصادر مختلفة :

تحتاج النباتات للفداء كي تعيش وتنمو شأنها في ذلك شأن سائر الحيوانات والانسان تماما . والنباتات الخضراء بالغة الاهمية لأنها تبني الفداء من خامات متناهية البساطة ، فهى تستخدم الغازات من الهواء والماء والأملاح من التربة وطاقة ضوء الشمس لتصنع غذاءها . أما الحيوانات فليس فى مقدورها أن تفعل ذلك وهذا هو السبب فى تسمية النباتات « المنتج الابتدائى » . فبعض الحيوانات تأكل النباتات وتاتى حيوانات أخرى لتأكل الحيوانات أكلة النباتات . وتعرف هذه العملية عادة باسم دورة الفداء . والنباتات خضراً من التى تبدأ الدورة . فلولاها لما توافر الفداء للانسان والحيوان .

وبعض النباتات لا تصنع غذاءها بل تعيش عالة على غيرها من النباتات والحيوانات الأخرى . وتوصف النباتات التي تعيش على حساب كائنات أخرى حية بأنها متطفلة ، أما التي تعيش على نباتات أو حيوانات ميتة فتعرف بأنها رمية . وقد يعتمد أحياناً نباتات مختلفان على بعضهما دون الأضرار بأى منها . وتعرف مثل هذه العلاقة التي يفيد منها النباتان بالتكافل .

وهناك قسم من النباتات التي تتغذى بطريقة شاذة جداً من النباتات المعروفة باسم النباتات «أكلة اللحوم» . وهذه النباتات لا تتوافر لها كل المواد الخام التي تحتاج إليها في صنع الفداء . وهي تقتصر المفترسات وتعتصر من أجسادها المواد الخام التي تنقصها وهي المواد الترويجية .




طرف المرجان

ثاني أكسيد كربون

اكسجين


غذاً مجهز

ما، وأملاح معدنية



عندما تصنع النباتات غذاءها تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو وتفرج ثاني الأكسجين وتقوم المادة الخضراء الموجودة في الأوراق ، والتي تعرف بالكلوروفيل ، باستخدام الطاقة الموجودة في ضوء الشمس كي تقول ثاني أكسيد الكربون والله إلى الأكسجين وسكرات بسيطة . بعد ذلك تتحول السكرات البسيطة إلى غذاً للنبات بينما يتغير الأكسجين المتبقى في الهواء . وتعرف عملية تجهيز الفداء هذه بالبناء الضوئي .

الأشنة في الحقيقة عبارة عن نباتين أحدهما طر والآخر طحلب . فالطحلب يجهز نوعاً واحداً من الفداء . وبجهز الطحلب نوعاً آخر مما يمكنهما من النجاح في الحياة مما . وتعرف هذه الظاهرة بالتكامل ، ويكون التعايشهما ببعضهما قلوباً بحيث يبدوان كما لو كانوا نباتاً واحداً يمكنه أن يعيش حتى على الصخر العاري .



اشنة

طر المرجان يمكنه أن يتغذى بطرقتين . فهو أما أن يتغذى على الأغصان الميتة أو على الأجزاء العية من النباتات . وتعرف هاتان الطريقتان بالترم والتقطل .

نباتات آكلة اللحوم



دروزيراء

تعيش النباتات آكلة اللحوم عادة في أراضي المستنقعات التي لا تحتوي على الترrogen الكافي . ولما كانت النباتات تحتاج إلى الترrogen ، لذا ثم تنتصره من العشرات التي تقتضيها . ولذلك ثلاثة أنواع من هذه النباتات .



قدر نيبثيس

إذا حطت ذبابة على أوراق الديونيا اطبقت عليها والتنفس داخلها .




ديونيا

يفتش نبات النيبثيس الحشرات داخل قدر موجودة في أطراف أوراقه . وتتجذب الحشرات هذه حلوة تتكون على حافة القدر . ثم تنزلق الحشرة عادة داخل القدر بسبب وجود طبلة شمعية فتحت داخل القدر وفرق في سائل عبارة عن مزيج من الماء والمطر والعصارات الهاضمة الموجودة داخل القدر .

يحصل نبات رافيليزيا على كل الغذاء الذي يحتاجه من جذور النباتات التي يتسلق عليها . ولذا فهو كامل التغذى . واحد انواع الرافيليزيا معروف ان زهرته أكبر زهرة في الدنيا اذ يبلغ قطرها ٤٥ سم (١٨ بوصة) . وهي وإن كانت تبدو جميلة جدا إلا ان رائحتها تشبه رائحة اللحم الفاسد . وتنمو في جنوب شرق آسيا .

نبات الدبق نبات شبه متسلق . فهو يصنع بعض الغذاء الذي يحتاجه باوراقه الخضراء . ولكنه ، نظرا إلى انه عديم الجذور ، يستمد الماء والأملاح المعدنية من النبات الذي يتسلق عليه . ويعرف النبات المتسلق عليه باسم العائل . والدباق الأزدوبين له ثمار بيضاء . وهناك نوع ثماره حمراء ، يعيش في شمال إسبانيا وأفريقيا .



دبق أحمر



رافيليزيا

مواعيد الأزهار

لكل نوع نباتي مزهر موعد خاص للأزهار .

الكماءوية في بعض النباتات التي تزهر في الخريف فتطلق عملية الأزهار من عقالها .

كذلك يتحكم التغير في الأمطار ودرجة الحرارة في مواعيد النمو والازهار ، فقد وجد ان نباتات اوركيد الملايو تزهر كلها عندما تنخفض درجة الحرارة قليلا بعد العاصف الرعدية المحلية .



حشيشة القمر

ساعة كيماوية

معظم النباتات الزهرية لها القدرة على الأزهار في أنساب موعد للتلقيع ، والسبب في ذلك هو أن أغلب النباتات لها ساعة كيماوية داخلية تستجيب للتغيرات في بيئتها .

والنباتات التي تعيش في المناطق المعتدلة تتأثر بالتغير في طول كل من الليل والنهار . فعندما يطول النهار في




بنت القنصل

نبات حشيشة القمر يكون أحيانا حوليا فيكمل دورة حياته في سنة واحدة ، وقد يكون في أحيان أخرى ثنايا العول ، أي انه يستغرق عامين حتى يكمل دورة حياته . وهو يعطى في السنة الأولى مجموعة من الأوراق وفي العام التالي يعطي الأزهار والبذور ويموت .

ينمو نبات بنت القنصل أصلا في المكسيك ويمكن زراعته في أوروبا . مثلا ، في بيوت زجاجية . وهو يزهر عادة في الخريف . وقد تمكن المهتمون بتربية النبات من دفعه إلى الأزهار في أوقات مختلفة من السنة بتغيير طول الليل والنهار . ويمكن التوصل إلى ذلك باضافة صناعية أو بوضعها في الفلام .

نبات القرن الأمريكي ينمو نموا بطينا جدا ، والمعروف أنه لا يعطي سوى ورقتين أو ثلاث فقط كل عام وقد يتطلب الأمر مائة عام حتى يزهر .

نبات القرن



استخدامات الأزهار :


إن القرنفل الذي نستخدمه في الطعام عبارة عن البراعم الزهرية الجافة لشجرة القرنفل . ويزرع نبات البريرووم بكثرة من أجل هاماته الزهرية التي تنتج ميدا حشريا هاما . أما الهامات الزهرية الجافة لنبات الألاقاندر فتحتفظ برائحتها العطرة مدة طويلة ، ويستخدم الزيت الذي يقتطع منها في صنع ما

براعم زهرية



قرنفل

بريشروم




لافندر



نباتات لا تزهر

يوجد ١١٠٠٠ نوع مختلف من النباتات التي لا تزهر .




مرض « قدم الرياضي » الذي ينتج عن فطر .
والفطريات نباتات غير زهرية ، ولذا فلا تتوقع ان
ترى اية ازهار نامية في اصابع قدميك اذا اصبت
بها المرض في يوم من الايام .


أنواع كثيرة :
تشتمل النباتات اللازهرية على البكتيريا والطحالب والفطريات والنباتات الكبدية والحزازية والسرخسية . ويتکاثر أغلب هذه النباتات بواسطة الأبواغ . والأبواغ ، بعكس البذور ، لا تنتج من الاندماج الجنسي . كذلك فان كثيرا من النباتات اللازهرية قادرة على التكاثر باقتطاع جزء من أجسامها ، وينمو الجزء المقطوع ليكون نباتا جديدا . والبكتيريا ميكروسكوبية تعيش على أي شيء تقريبا . وبعضها يؤدى الى الأمراض . وتتفاوت أغلب أنواع البكتيريا بتحليل المواد الميتة المعقدة ، شأنها في ذلك شأن أغلب الفطريات . والبكتيريا والفطريات إنما يعيidan بهذا العمل دورة النفايات في الدنيا .



ستربتومايسن جرييسن نوع من البكتيريا يستخدم في إنتاج المضادات العصبية مثل الستربتومايسين . وهو يوقف نمو الكائنات الأخرى كأنواع البكتيريا الفقارية . وهناك في الوقت الحال عدد أنواع من البكتيريا والفطريات التي تستخدم في صنع عقاقير تندى حياة الإنسان .



جبن جروبيه




جبن روکفور

الجبن والبيرة :
يصنع الجبن بفعل بكتيريا خاصة على اللبن . وتحصل هذه البكتيريا على طاقتها بان تحول السكرات الموجودة في اللبن الى حمض لبنيك . وهذا التفاعل يمنع نمو الانواع البكتيرية الأخرى التي قد تؤدي الى تحلل الجبن . وبعض انواع العفن الازرق ، مثل البنسيليوم ، لها القدرة على وقف نمو البكتيريا . وفطر بنسيليوم روکفور تاي هو الذي يعطي جبن روکفور طعمها المميز .

يستخدم فطر الخميرة في صنع البيرة ، فهو يقوم بتحمير سكر الشعير البسيط داخل حبوب الشعير النابتة . وتحمّي هذه المعاملة الى انتاج الكحول وثاني اكسيد الكربون . وتصاف حشيشة الدينار الى البيرة لتكتسبها نكهة ذات مرارة .



بشر




اذا نظرت الى السطح السفل لورقة نبات سرخسي فقد تشاهد بعض بثور الأبواغ التي تبدو كبقع صغيرة بنية اللون . وتحتوي البثور على ابواغ السرخس الدقيقة ، التي ينتهي بها الأمر الى الانفصال عن النبات الام لتكوين نباتات جديدة .

غذاء تحت الأرض

بعض النباتات تستطيع احتزان الطعام
لاستعماله في الأوقات العصيبة .



تحتوي الجلود الدرنية لنبات الكاسافا على حمض البيروسيك السام الذي يجب التخلص منه قبل أكلها . وللتخلص من السام تنشر الجلود وتصحن وتصفى ، وتُقلل بعد ذلك .



تزرع في غرب إفريقيا عدة أنواع من نبات اليام ، وهي تستعمل كالبطاطس تماما ، أما بنجر السكر فهو محصول غرب أوروبي . ويستخرج الزنجبيل من سيقان تحت أرضية ، ويزورق ، واحد النباتات الاستوائية .



لقد كان الانكماش الذين عاشوا في بيوت بأمريكا الجنوبية أول من زرع البطاطس . وقد أدخلت زراعتها في أوروبا في القرن السادس عشر وأصبحت الآن غذاء أساسيا في العالم كله .

مخازن غذاء تحت الأرض :

تحتزن نباتات كثيرة غذاءها في أجزاء منها تحت الأرض . وقد تكون الأجزاء تحت الأرضية جذورا أو سيقانا أو أوراقا متحورة . ويختزن النبات الغذاء أثناء فترة النمو النشط ويحتفظ به للأوقات العصيبة ، وهي البرودة أو الجفاف . والنباتات التي تمتلك مثل هذه المخازن هي عادة النباتات التي تموت أوراقها في الأوقات القاسية ، حين يكمن النبات . وعندما يحل جو أكثر ملائمة يستخدم النبات غذاءه في اعطاء سيقان جديدة من براعمه الكامنة .

وكثيرا ما يدرك الإنسان والحيوانات أن هذه المخازن الغذائية تحت الأرض تلزمها كفداء .



يساعد البرسيم في الاحتفاظ بخصوبة الأرض، وتوجد على جذوره عقد صغيرة تحتوى على بكتيريا تأخذ الترrogen من الجو . ويمتص البرسيم الترrogen من هذه العقد ، وعندما يعرث مع الأرض ثانية فإنه يعيد إليها الترrogen لاستهلاكه من النباتات الأخرى .

النسخ النباتي والقلف

تستمد كثير من المواد النافعة من نسخ وقلف النباتات .

شجرة مطاط بارا



تصنع سهوم السهام من عصارة عدة نباتات ، فالكوراد ، مثلا ، يصنع من نسخ نباتات متسلقة توجد في أمريكا الجنوبية . ويعمل هذا السم على شلل العضلات مما يضع الرئة من أداء عملها .

تنتج عدة نباتات حليبا يحتوى على المطاط . وتدفع شجرة مطاط بارا ، التي تظهر صورتها في هذه الصفحة ، أحسن الأنواع . واستخراج الحليب من الشجرة يقطع جزء دقيق من القلف في منطقة الجذع ويعجم الحليب الذي يسيل من القطع .

أشجار تدمى :

ان المواد التى تسيل من جرح فى النبات لها مصدران ، فتحت القلف مباشرة يوجد النسيج الحى الذى ينقل الغذاء والماء فيما بين الأوزاق والجذور . ويسمى هذا السائل عادة بالنسخ . وإذا قطعت بعض الأشجار ، كالعنب والاسفندان ، فى الربيع فانها « تدمى » .

والمواد الأخرى تكون عادة مواد غالقة للجروح . ومنها مجموعة تعرف بالراتنجات . وتنتج نباتات كثيرة حليبا نباتيا يحتوى على الأصماغ . وهذا الحليب النباتى يتجمد بمجرد تعرضه للهواء .

وفي القلف بعض مواد مفيدة لنا كسموم أو كعاقير ، فالكينين الذى يستخدم فى علاج الملاريا يأتي من قلف شجرة السنكونا



صنعت هذه المنتجات كلها من نسخ الأشجار . فالأحدية المطاطية واللادن مصنوعة من الحليب النباتى . ويستخرج شراب الاسفندان من نسخ شجرة الاسفندان أما زيت التربنتين فيمكن صنعه من راتنج اشجار المخروطيات كما يعطى راتنج شجرة الصمغ العربى نوعا من الصمغ المفيد .

فوائد الأوراق

الأوراق ذات فوائد عديدة لنا وللنباتات التي تصنعها .



بالرغم من أن الأوراق تؤدي نفس الوظائف الأساسية غير أن أوراق النباتات تختلف فيما بينها ، فمثلاً تلاحظ أن معظم الأوراق قد صممت لكي تستقبل الضوء ، فالنباتات التي تنمو في الأماكن الظلية تتميز بأوراقها الخضراء الداكنة التيتمكنها من استقبال أكبر كمية من الضوء ، وعكس ذلك تماماً فإن النباتات التي تعيش في المناطق المشمسة قد تتعرض لكمية من الضوء أكثر من اللازم ، لذلك تكون أوراقها صغيرة وقد تكون مقطعة بطبقة شمعية لكي تقلل من فقد الماء . ولأوراق النبات فوائد متعددة ، فهي تستخدم غذاء لكثير من الحيوانات ، كما أن الإنسان يستعملها في أغراض متعددة ، وتشاهد في هذه الصفحة بعضًا من هذه الاستخدامات .

الأوراق تنوع :

إن أوراق النبات هي أولى الأماكن في إنتاج الغذاء ، فهي التي تنتج المواد الخام التي يحتاجها النبات كي يعيش وينمو .

وعروق الورقة هي خطوط الأمداد ، فهي تنقل الغذاء الذي تم صنعه في الأوراق كما تجلب كميات كبيرة من الماء إلى الأوراق . ويستخدم بعض هذا الماء في عملية صنع الغذاء (البناء الضوئي) كما يفقد جزء كبير من الماء بعملية التنفس من الأوراق إلى الهواء . وقد تستهلك شجرة البلوط الكبيرة كمية من الماء قد تصل إلى 1000 لتر (250 غالون) في اليوم الشمسي .

لا يأكل الإنسان العشيش لصعوبة هضمه ، أما الأبقار فيمكنها ذلك لأن جهازها الهضمي من نوع خاص . ونحن بدورنا نأكل لحم الأبقار وشرب لبنها . وهذه العملية توفر دورة غذائية بسيطة .



الشاي :

نبات الشاي من أقرباء الكاميلية . ولانتاج الشاي تؤخذ أطراف الأغصان المورقة الخديشة وتترك حتى تخمر تغمرها جزئياً ، أو تتحلل ، حتى تصبح ذات نكهة ، ثم تجفف بعد ذلك . ويعتبر الشاي على عقار يسمى الكافيين .

تجفيف الشاي



قطف الشاي

يمكن للإنسان أن يأكل بعض أوراق النباتات ، فنحن نستخدم أوراق الأعشاب كالعنبر والبلدونس لتنمية الفداء . وناترى النكهة من زيوت توجد في أوراق النبات وسيقانه . والزيت الموجود في أوراق شجرة حسى لبان يستخدم في صنع العطور .

الأعشاب :



يستخدم الهنود في البرازيل أوراق اليوفوربيا لسميم السمك ، فهم يضعون الأوراق بعرض النهر على قواطع خشبية ثم يدقون الأوراق بهراوة حتى تسيل عصارتها السامة في النهر . وتؤدي عصارة الأوراق إلى شكل الأسماك التي يسهل الامساك بها بعد ذلك .



أوراق نبات قفاز الثعلب ، واجزء آخرى منه ، سامة ، ويؤثر سماها في العضلات والقلب . ولقد اكتشف الأطباء أن هذه السموم اذا استخدمت بالجرعات الصغيرة فانها يمكن ان تكون علاجا لبعض المرضى .

السيسال :

يستخدم السيسال في صنع العبال . وتصبح الأوراق صالحة للقطع بعد أربع سنوات . ويُسحق الجزء الرخو من الأوراق حتى لا يتبقى سوى الغروق . بعد ذلك تفصل الألياف وتجفف . وقد اشتقت كلمة سيسال من اسم ميناء في المكسيك ، غير ان المحصول يزرع أساسا في شرق البريقايا .



عندما وصل كولمبوس الى أمريكا وجد أن بعض الهنود يدخنون أوراق نبات التبغ . والأوراق تجري معالجتها قبل التدخين ، وتشمل العملية تخمير الأوراق ثم تجفيفها . ويعتوى التبغ على عقار النيكوتين الذي ينبه الأعصاب ، ويمكن ان يؤدي إلى الأضرار بالجسم .



ينمو نخيل كارنوبيا في شمال شرق البرازيل . وأوراقه مقطعة بطبقة شمعية . ينزع هذا الشمع من الأوراق المسنة بالدق ويستخدم في صنع الورنيشات والأقلام وورق الكربون .

نخيل كارنوبيا



فوائد الساقيات

نحن نستفيد من قوة الساقان واليافها في صنع أشياء كثيرة .

يصنع الأهالي في بحيرة تشاد بأفريقيا الزوارق من ساقان البردي . وهي لا تنفذ الماء أبداً . وقد اثبت ذلك الترويجي ثور هيردال عندما أفلج بزورق كبير من البردي ، سماه دع ٢ ، عبر المحيط الأطلنطي من أفريقيا إلى أمريكا سنة ١٩٦٩ .



بردي

صنع الورق :

استخدم قدماء المصريين ساقان البردي في صنع الورق . كانت الساقان تشق طولاً وتدق مع بعضها حتى تتماسك في صورة صحافة مفلطحة . وقد صنع الصينيون الورق سنة ٥٠٠ ق.م. ، وكانوا يستخدمون في صنعه اليافا مثل الياف الكتان والعشاشر .



جمع الكتان في مصر الفرعونية



لقد استخدم الكتاف منذ قديم الزمان في صنع الأقمشة الكتانية . تستخرج الألياف من الساق الخشبية بالتعطين . وهي عملية تشمل نقع الساقان في الماء حتى تتحلل تحللاً جزئياً ثم تلف الألياف وتمشط . بعد ذلك تصنع الألياف في هيئة خيوط للفزل . وكانت نباتات الكتان تجمع باقتلاعها بعذورها من الأرض كما هو موضح في هذا الرسم المصري .



الجوت محصول نسيجي هام في البلاد الدافئة . تنسج الياف ساقه اللينة ليصنع منها نسيج قوي . ويستخدم هذا النسيج في صنع أشياء مثل الخيام وأغطية الكراسي وغيرها مما يتطلب أقمشة متينة .



السيقان قوية :

ساق النبات له وظيفتان ، أولاهما أنه يحمل جميع الأوراق وأجزاء التكاثر في النبات ، ولذا وجب أن يكون شديد القوة حتى يقاوم الرياح والأعاصير وشدة الحرارة والبرودة .

أما الوظيفة الثانية للساق فهي أنه ينقل المواد فيما بين الأوراق والجذور . وتعمل الألياف الناقلة عمل شبكة المواشير التي تربط بين جميع الأجزاء الحية في النبات .

ويتكون خشب النبات من أنسجة ناقلة مسنة ترك في وسط الساق بعد أن تكون له أنسجة جديدة حولها . ولحمياتها من التعطن ، ولتقويتها ، تترسب مواد خاصة كالثاني داخل الأنسجة الناقلة المسنة .

والخشب متين ولا يتحلل بسرعة ، وبعض أنواعه أقوى من البعض الآخر . وتتمثل الأشجار البطيئة النمو كالبلوط والجوز والتوك إلى صنع خشب صلد بينما تصنع السريعة النمو ، مثل تنوب دوجلاس والخشب الأحمر ، خشبا رخوا . وتستخدم الأخشاب الصلدة في صنع الآلات الفاخرة بينما يستخدم الخشب الرخو عادة في صناعة الورق . هذا ويستخدم حاليا حوالي ٤٠ في المائة من الخشب الذي يقطع في العالم كافة في صناعة الورق . وقد أصبحت الأخشاب الفاخرة النوع ذات التجزيعات الجذابة ثمينة نادرة حتى أنها تقطع الآن في صورة طبقات رقيقة تستخدم في تكسية الأخشاب الأقل جودة .



بلوط



اللون والتجزع في الخشب يبينان اختلافاً في التركيب وفي معدلات النمو .



لقد أصبح المهتمون بزراعة النباتات يزدعون غابات فسيمة من المخروطيات سريعة النمو، وذلك لمواجهة الإقبال الكبير على الأخشاب . وعادة لا تكون هذه الغابات الفريدة قادرة على سد حاجة السكان الوطنيين ، مما جعل أصحاب الغابات يفضلون زراعة المخروطيات ومهمها أشجار أخرى غيرها .



لقد أصبح الطلب على الخشب في العالم كله كبيراً إلى درجة أدى إلى الآلاف الآلاف الفدادين من الغابات كل سنة ، فالغابة التي استغرقت قرونًا كي تنمو يمكن إزالتها بالألات الحديثة في ساعات .

فوائد البذور والثمار

تعتبر كثيير من البذور والثمار مصدرا هاما للغذاء والشراب ، الا أن بعضها سام .


غذاء من البذور :

يوجد بداخل كل بذرة حية جنين ينمو ليعطي في آخر الأمر نباتا جديدا . والجنين محاط بعذاء مخزن يتغذى عليه أثناء الانبات قبل أن يصبح قادرًا على أن يصنع غذاءه بنفسه . كذلك فإن الغذاء المخزن داخل غلاف البذرة مصدر هام لغذاء الحيوانات . وربما كانت أهم البذور التي تأكلها هي محاصيل الحبوب .

وتحيط بالبذور أحيانا ثمرة لحمية . وبذور كثيير من الثمار التي تؤكل يمكن أن تمر داخل القناة الهضمية للحيوانات دون أن تتأثر حتى تخرج مع برازها .

وهنالك فوائد أخرى للبذور ، فمثلا تستخدم ألياف الليف الأحمر القوية التي تحيط بجوزة الهند في عمل الخصير . وتحتوي كثيير من البذور ، كالفول السوداني وجوز الهند ، على غذاء زيتى مخزن . وهن تزود الجسم بالبروتين اذا أكلت ولكنها تعصر فى كثير من الأحيان لاستخراج الزيت منها للأغراض الصناعية . كذلك قد تحتوى البذور على كثيير من المواد التي تستخدم فى التنكهة .

وتحتوى نباتات كثيرة على مواد سامة في بذورها ، لذلك فإنه ليس من الصواب أكل أية بذور بغير معرفة .



أرز

شعير شوفان جاودار قمح

يزرع الأرز في حقول مفرقة بالما ، ويستمد غذاءه من الماء . وتصرف المياه من الحقول عندما تنضج البذور استعدادا للحصاد . وتؤدي هذه الطريقة في الزراعة إلى استخدام نفس الحقل سنة بعد سنة دون راحة ، وذلك لأن الأرز لا يعتمد على التربة في غذائه اعتمادا كلبا .



تعطي محاصيل الحبوب غذاء رئيسيًا في العالم كله . وهي تتبع فصيلة النجيليات ، وتحصد منها البذور . وقد زرعت محاصيل الحبوب منذ آلاف السنين . وهناك دليل على أن إنسان العصر الحجري الحديث قد زرعوا القمح والشعير .



قطن


تنسج الأنسجة القطنية من الألياف الطويلة التي تحيط ببذور نبات القطن . وتبعد البذور والقشور قبل عملية الغزل . ويستخرج زيت للاكل من البذور ويستخدم مايختلف عنها كغذاء للماشية ، وتغزل الألياف وتنسج على هيئة اقمشة متعددة ، ويعتبر صوف القطن ناتج عرضي لعملية النسج .

الفول السوداني




بعد أن تلقي زهرة الفول السوداني ينمو منها حامل طويل ، يسمى حامل البيض ، ويدخل في التربة . ثم تتكون الجبة عند طرفه .





جمع الزيتون :

يبين هذا الرسم الاغريق القديم ثمار الزيتون أثناء الحصاد . وقد جرى حصاد الزيتون من اشجاره في حوض البحر الابيض المتوسط منذ الايام الأولى . والشمار اما تخلل وتوكيل واما تعصر لاستخراج الزيتون .



توجد اشجار نخيل جوز الهند في المناطق الاستوائية . ويوجد بداخل كل ثمرة سائل حليبي يمكن شربه . كذلك يمكن اكل لحم الثمرة او عصره لاستخراج الزيت الذي يستخدم في صنع كنافز من الاشياء كالصابون والمسل النباتي . ويعرف الجزء الشعري من الثمرة بالليف الذي يمكن تسجيه في هيئة حصير خشن .



القهوة والكاكاو :

لقد زرع العرب القهوة في بادى، الأمر ، وكانوا يطعنون البذور ويغلوظونها بالزبد لصناعة غداة للرحلات الصحراوية الطويلة . وعند تصنيع البن تفصل القشور واللب عن البذور الموجودة في الوسط . بعد ذلك تعمص البذور الجافة وتصنع ليصنع منها مشروب القهوة .

تؤخذ بذور الكاكاو من شجيرة صغيرة اكتشفت في بداية الأمر في أمريكا الجنوبية . وتصنع الشوكولاتة من البذور بعد تحريرها تحريرا جزئيا . وتنشأ الأزهار والبذور على الساقان الرئيسية للنباتات . وظاهرة خروج الأزهار من الساق الرئيسية للشجرة ظاهرة منتشرة في اشجار الغابات الاستوائية .



نباتات ما قبل التاريخ

لقد نشأت النباتات المعقدة من بدايات بسيطة .
وبدراسة النباتات الحية يمكن التعرف على أصولها .



استمر العصر الكربوني وشفل الخمسة من ٣١٠ إلى ٢٤٠ مليون سنة .
اننا، هذه الخمسة كانت توجد نباتات شبه سرخسية ذات اوراق حقيقة .
وفي نهاية هذه الخمسة انتجت بعض هذه النباتات ، السراخس البذرية ،
اولى البذور . والبقايا الحفريّة لنباتات العصر الكربوني هي التي تكونت الفحم
الذي تستخرجه من باطن الارض الى يومنا هذا .

نشأت الاشجار البحرية البدائية في العصر الديفوني (منذ ٣٥٠ - ٤٠٠ مليون سنة) . وفي هذه الانماط كانت النباتات الأرضية الأولى ذات السيلقان قد بدأت هي الأخرى في الظهور . وتم تكثيف تكوين هذه النباتات آية اوراق او جذور حقيقة . وقد بدأت أولى احيوانات البرمائية في الظهور اننا، العصر الديفوني .


حفرات على قيد الحياة

يعتمد ان تكون السراخس الشجيري التي
تنمو حاليا في المناطق الاستوائية قريبة الشبه جدا
بالأشجار التي ظهرت ابان العصر الكربوني .

اسلاف النباتات التي وجدت متحففة . لم تتغير هذه النباتات الا قليلا
جدا عبر ملايين السنين . وقد وجدت اقربا، لشجرة كزبرة البذر قرب نهاية
العصر الباليوزوئي (منذ اكثر من ٢٠٠ مليون سنة) . ويوجد حاليا نوع من
هذه الشجرة مازال حيا وينمو بريا في الصين .



احفورة لکزبرة البذر



من شجرة کزبرة البذر




شجرة سرخس





تنافس جزر سيشل بالحيط الهندي من قم جبال غارقة في مياه المحيط ، وكثير من نباتات هذه الجزر لا توجد في أي مكان آخر في العالم . وتعرف نباتات هذه المنطقة كالنخيل الصغير والبها الأبيض الموضح في الصورة ، بأنها مستوطنة لأنها تنمو في مكان واحد معين .



شجرة العشب

تمكنت النباتات من التطور بطريقها الخاصة ، وهذا هو السبب في أن نباتات استراليا ، كأشجار الشب والصمغ ، فريدة في نوعها .


لقد انتعمت استراليا من باقي القارات في مرحلة مبكرة من تاريخ الأرض . لهذا السبب

يقدر عمر الأرض بحوالي 4500 مليون سنة ، وقد أثبت علماء النباتات أن الطحالب والبكتيريا قد وجدت منذ 200 مليون سنة على الأقل . وكانت هذه النباتات هي التي ساعدت في إيجاد الأكسجين في الجو فمهماً الجو لظهور النباتات الأرضية والحيوانات التي تنفس الهواء .

ومن هذه النباتات الأولى انقضت 1600 مليون سنة قبل ظهور أولى النباتات الأرضية ذات الساقان . ومنذ ذلك التاريخ نشأت ، وما زالت تنشأ ، طرز نباتية متعددة مختلفة . وما زلنا في حاجة إلى معرفة الكثير عن النشأة المعقّدة للنباتات عبر ملايين السنين التي وجدت فيها .

ومن البقايا النباتية الحفريّة يجمع علماء النباتات الحفريّة المعلومات اللازمّة للتعرّف على النباتات التي عاشت وما تزال من زمن بعيد . وعندما زادت النباتات تعقيداً باتت الأشكال النباتية التي لم تنجع في البقاء . غير أنّ كثيراً من الطرز الأولى قد نجحت في البقاء وما زالت سلسلاتها حية حتى الآن .



وتوجّد الأنواع المختلفة من النباتات ، في وقتنا هذا ، في أماكن مختلفة من العالم ، وقد أدى إلى نشوء هذه المناطق النباتية . وتدعى فلورا . ما حدث من تغيّرات جيولوجية في الماضي . وقد عزلت في الماضي مساحات من الأرض واتصلت مساحات أخرى ببعضها ، بل وغرق بعضها تحت البحار . كذلك فقد تغيّر المناخ . وقد ساعد هذا الاختلاط بين النباتات المعزولة في مختلف الأجزاء إلى خلق تشكيلاً كبيرة من النباتات .



في نهاية العصر الجليدي بدأت النباتات التي نجحت في البقاء في المناطق الدافئة في الانتشار في الأماكن العازلة التي انحصر عنها الجليد . وفي أمريكا الشمالية تعرّكت النباتات شمالاً بعدها . الخزان الجليدي الذي يتجه من الشمال إلى الجنوب . أما في أوروبا فالجبل تمتد من الشرق إلى الغرب وتكون حاجزاً لم تتمكن نباتات كثيرة من اجتيازه ، لهذا السبب لم تتمكن نباتات كثيرة من العودة تاركة شمال أوروبا وبه عدد من النباتات يقل عمّا هو موجود في آسيا وأمريكا .

جلد المدحّيات

عندما يسافر الانسان حول العالم فانه يجلب معه النباتات ويدخلها في مناطق جديدة .



لقد جاءت كثير من المحاصيل التي نزدعها
بشكل اساسي من مناطق اخرى من العالم ، ففي
ماضي جلب الناس معهم ، اثناء ترحالهم من مكان
الى آخر ، نباتات جديدة وأعادوا معهم نباتات
اخري . وكان من نتيجة ذلك ان توافرت للناس
في كثير من البلاد تشكيلاً كبيرة من الأغذية .

لقد قام الكابتن بلاى في القرن الثامن عشر
بمحاولة ضخمة في إدخال النباتات لمناطق جديدة
ولكنها لم تنجح . ولما كان الكابتن بستانياً وعالم
نبات على سفينته بونتي فقد جلب معه على السفينة
نباتات ثمرة الخبز من جزيرة تاهيتي . وعندما
تمرد عليه الملاحون أنزلوه وبعض الملاحين في قارب
صغير والقوا بنباته على الأرض .

النباتات تسافر حول العالم :


لقد كانت النباتات تنتشر دائماً
بالطبيعة إلى أماكن جديدة كلما كانت
الظروف مواتية لذلك . إلا أن الناس
أيضاً في أسفارهم من قارة إلى قارة قد
حملوا معهم النباتات وزرعوها في
مختلف الأماكن .

وعندما بدأ الأوروبيون في الهجرة من أوربا إلى القارة الأمريكية ، أخذوا معهم شيئاً من محاصيل الدنيا القديمة ، كالسكر والموز والقهوة . كما أرسلوا بدورهم إلى أوربا محاصيل ومنتجات أمريكية مثل الكاكاو والتبغ والكينيز والأناناس والبطاطس والطماطم .

وفي أواخر القرن التاسع عشر أدخلت
شجرة مطاط يارا من البرازيل إلى
الشرق الأقصى ، وفي أقل من قرن كانت



بستانى الحدائق فى بحث مستمر عن انواع جديدة من النباتات . ولقد جلت أزهار كرز الذئبة فى بداية الأمر من اليابان حيث كانت تزرع منذ قرون . والليلاك نبات يستوطن جبال شرق اوربا ، أما نبات الهيباسترم الذى لا ينمو فى البلاد الباردة الا اذا كان داخل بيوت زجاجية فقد وجد فى بادى ، الأمر مزهرا فى مراعى امريكا الجنوبية .




ليلاك



هيبياستروم



كرز مزهر



كروم العنب :

لقد زرعت الاعناب التى تصنع منها الانبطة فى اوربا منذ قديم الزمان . وفي النصف الثانى من القرن التاسع عشر دخل اورباقادما من امريكا ، عدد من امراض العنب ، وانتشرت هذه الامراض بسرعة لأن الاعناب الاوربية لم تكن لديها القدرة على مقاومتها . وقد سبب احد هذه الامراض وبا ، فتاكا الى ان اكتشف ميد فطري كيماوي .

الاعشاب :

قد يؤدى ادخال نبات معين فى بلد ما الى نتائج سيئة . فمثلا . جلبت الى استراليا من امريكا اشجار من صبار التين الشوكى . وانتشرت هذه الاشجار بسرعة كفا تغطى الاعشاب ، حتى ان اشجار التين الشوكى أصبحت فى سنة ١٩٢٠ تغطي مساحة ٦٠ مليون فدان من أراضي استراليا . ولم يمكن السيطرة على هذه النباتات الا بعد ان استورد الاستراليون يرقان فراشة من فراشات الصبار التى تتغذى على ساقان التين الشوكى الحديثة . وقد حدثت مشكلة مشابهة فى بحيرة خزان كاريبيا الصخمة بروديسيا ، اذ ما ان تكونت البحيرة حتى تغطى سطحها بنوع من السراخس المائية اسمه ساليفينا .

خزان كاريبيا



صبار التين الشوكى



فلاحة الأرض

كانت قبائل العصر الحجري الحديث أول من زرع الأرض من البشر .

كيف بدأت الفلاحة :

لم يزرع الناس الأرض في كل وقت إذ انهم كانوا في البداية يصيدون الحيوانات البرية ويجمعون النباتات البرية لغذائهم . وكانوا مضطرين الى التنقل كثيراً مما لم يتيح لهم فرصة لتكوين المهارات المختلفة .

وقد ظهر الفلاحون الأوائل في الشرق الأوسط في أيام العصر الحجري الحديث وبدأوا يرعون الحيوانات ويزرعون المحاصيل . ولقد ساعدتهم ذلك على الاستقرار في مكان واحد وأتاح لهم الفرصة لظهور مختلف المهارات .

وقد أدى الاستقرار في المياه



في وادي النيل - وهي مصر بالتحديد - لا يوجد مطر كافٍ لري المحاصيل ، وفي الأيام التي سبقت نظام الري كان الفلاحون يعتمدون على الفيضان السنوي لنهر النيل في زراعة محاصيلهم . والنهر يفيض في الصيف فيخصب تربة الوادي بترسيب الطمي والماء . وكان الفلاحون يزرعون أراضيهم عندما ينحسر الماء في الخريف . وكانت النباتات تنمو أثناء الشتاء المعتمد وتحصد في الربيع قبل قدوم الفيضان التالي .



يفيض نهر النيل في الصيف



الحراثة في الخريف



تزرع المحاصيل في الخريف



المحاصيل تنمو في الشتاء



تحصد المحاصيل في الربيع



يعود فيضان النيل في الصيف

تمارس في بعض المناطق الاستوائية طريقة القطع والحرق في زراعة الغابات . في هذه الطريقة تقطع الأشجار والشجيرات في مساحات صغيرة من الغابة وتحرق ثم تزرع المحاصيل في المساحات الفضاء . بعد ذلك مدة تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات حتى تفقد خصوبتها . وبعد ذلك تجهز مساحات أخرى بدلاً منها .

والانتظام في الفداء إلى زيادة في عدد السكان حتى انتهى الأمر بالبعض إلى الهجرة إلى أراضٍ جديدة آخذين مهاراتهم معهم . واقتصرت الأشجار من مساحات كبيرة من أراضي القبابات وزرعت بالمحاصيل ، كما تعلم المزارعون رى الأرض بحفر الآبار وشق الترع . وعندما كانت المحاصيل تفيض عن حاجتهم كانوا يبادلون بها أشياء أخرى ، ومن هنا نشأت التجارة وتطورت .

الدورة الزراعية :

عندما زرع الفلاحون قطعة الأرض الواحدة سنة تلو السنة وجدوا أنها لم تعد تعطي بعد بعض سنوات محصولاً جيداً لأنها استهلكت . ولتفادي ذلك يجب ترك جزء من الأرض ليستريح ، أي بدون زراعة ، مدة عام أو اثنين قبل المسودة إلى زراعته ثانية . وبتزايده المعلومات وجد أنه بتغيير نوع المحصول المزروع كل سنة وأضافة السماد للأرض لم يحدث اجهاد للأرض . والسبب في ذلك هو أن كل محصول يأخذ من التربة أملاكاً معدنية تختلف عن غيره . كذلك فإن تغير المحصول يمنع استقرار الآفات .

كانت تستخدم في إنجلترا في العصور الوسطى دورة زراعية بسيطة . وكانت الحقول تقسم إلى شرانط موزعة في ثلاث مجاميع . تزرع المجموعة الأولى بالقمح أو الجودار ، والثانية بالشعير أو الشوفان . أما الثالثة فكانت تترك


بدون زراعة للراحة . وكان تعاقب المحاصيل يتغير كل سنة . ففي السنة الثانية من الدورة كان حقل القمح يزرع بالشعير ويترك حقل الشعير للراحة ويزرع الحقل الذي كان متروكاً للراحة بالقمح . بهذه الدورة يزرع ثلثا الأرض باستمرار .

كانت البيوت الراجحة تطوراً هاماً . وهي تستخدم في المناطق الباردة لتربيه البذاريات وفي زراعة النباتات في غير موسمها وكذلك في زراعة نباتات المناطق شبه الاستوائية التي لا يمكنها الحياة خارج البيوت في الشتاء . يدخل فسو-

الشمس خلال الزجاج أما باقي الأشيا ، الازمة للزراعة فأنها تقدم صناعياً . على العامل في هذه الحالة أن يروي النباتات ويراقب رطوبة الجو ويسمد التربة ويقدم للنباتات دفعة صناعية أثناء الليل .



الدورة الزراعية :



لقد أجريت في بلجيكا في القرن السابع عشر دورة زراعية أكثر كفاية ، فكان كل حقل يمر بدورة تستغرق أربع سنوات . كان القمح يزرع في السنة الأولى تعقبه في السنة التالية محاصيل جذور وشعير في السنة الثالثة ، ثم في السنة الرابعة ، محصول من نباتات الرعي مثل العشيش أو البرسيم لتغذية الماشية . وكانت الحقول المختلفة تمر بهذه المراحل بحيث توافر المحاصيل جميعاً كل سنة ، أي أن كل حقل كان ينتج شيئاً كل سنة .

الحدائق عبر العصور

الحدائق تسر الناس في الدنيا كلها .

جميع أنواع الحدائق :

لقد اهتم الناس بالحدائق زمنا طويلا . وبعض القبائل في غينيا الجديدة ما زالت على ثقافتها منذ العصر الحجري . وهم يزرعون الحدائق بالغذاء بجانب الصيد والقنص . كذلك فهم يزرعون الأزهار حول منازلهم ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الناس . وهم لا يزرعون الأزهار لفائدة لها ولكن لجمال شكلها . وقد زرع قدماء الآشوريين والمصريين والانكاس الحدائق في مدنهم . وكانوا عادة يزرعون أشجار الشمار والنباتات الطبيعية وبعض نباتات الزينة أيضا . وقد أغمر الرومان بالحدائق وكانت يزيونها بالتحف والتماثيل .

ويبدو أن المجتمعات المختلفة كانت لها طرزاً خاصة في عمل الحدائق . فمثلاً تشتهر الحدائق العربية باستخدام ماء الجداول والشلالات كما كانت الحدائق اليابانية تظهر حب اليابانيين للطبيعة . وكانت الحدائق الرسمية التي تخطط في أشكال معقدة شائعة في دول أوروبا في القرن السابع عشر . واشتهرت الحدائق الانجليزية بمناظرها الطيبة الخلابة .

وظهرت حدائق النباتات الطبيعية منذ قرون مضت ، وبزيادة معلوماتنا في علم النبات ، أصبحت هذه الحدائق مراكز للتعليم والبحث . كذلك لعب الأفراد الذين اشتغلوا بالحدائق النباتية دورا هاما في جلب النباتات من كافة أنحاء الدنيا .


رسم على العائط في مقبرة من مقابر القدامى المصريين بين واحدة من حدائق العصر ، ويلاحظ أن الحديقة كانت جيدة التصميم وتحتوي على بركة وأشجار الفاكهة .



كثيراً ما كانت الأديرة الانجليزية في القرن السابع عشر تمتلك حدائق للأعشاب التي كانت تزرع أساساً كأدوية علاجية ، وكانت الأعشاب الانجليزية تستخدم بالإضافة إلى النباتات التي كانت تجلب من أوروبا والشرق الأوسط .

أنشئت حديقة قصر فرساي بفرنسا في القرن السابع عشر للملك لويس الرابع عشر ، وصمم الحديقة إندريه لي نوتير الذي جعل الحديقة تبدو كبيرة مثيرة للاعجاب بدرجة استلزمت تعسين قصر فرساي كي يتماشى مع بهاها .





كان لونسلو براون أشهر حدائق القرى الى اراض ذات مناظر تبدو طبيعية خلابة بما فيها الشمن عشر ، وكان يكتفى باسم « براون الكلف » من منحدرات نجبلية وأشجار متراكمة وبعرات



الهولنديون شفلا بزهور التيوليب التي انتشرت
استخدامها حتى ان البصلة الواحدة من سلالة
جديدة كانت تباع احيانا باكثر من مائة جنيه .
ومازالت الابصال تزدوج حتى الان بكميات كبيرة
في حقول الابصال الهولندية .

لقد كانت اسلاف تيوليب العدائق تمر
بورية في الشرق الأوسط ، لقد زرعت في تركيز
عده قرون قبل دخولها إلى هولندا في القرن
السادس عشر . وفيما بين ١٦٣٤ ، ١٦٣٧ جن

بني « بالم هاووس » في حدائق النباتات الملكية في « كيو » بإنجلترا في القرن التاسع عشر ، وتبني هذه الحدائق إلى حد ما المأهاف العجمية . حيث تعرّض نباتات من جميع أنحاء العالم وتقدم عنها المعلومات ، وفي هذه الحدائق يتدرّب علماء النبات ويدرسون .



التدبّب فن قص الشجيرات الدائمة
الخفرة على اشكال مختلفة جميلة . وهي
عملية تتطلب كثيراً من العمل لأنّه لابد من
تقرارها من آن لآخر ، وربما كان هذا هو
السبب في كونها أقل شيوعاً مما كانت .

شجر پونسای :

لقد كانت أشجار بونسai الأصلية اليابانية توقفت عن النمو في الجبال وقد اعتاد الناس أن ينقلوها من الأرض الصغيرة التي تتسخها الرياح فوق الجبال ويزرعونها في ظاسات . وأملأب هذه الأشجار حاليا يتم الحصول عليه صناعيا بكثرة تقد الساق وحسر الجذور .



المتوازن في الطبيعة


تعيش نباتات الدنيا وحيواناتها معاً في توازن دقيق معقد .



عالم البلوط

وقود متحفّر :

يتكون الـبيـت في التـرـبة الرـطـبة من بـقاـيا النـبات العـازـية والـعـشـائـش . وقد تكون البـترـول والـفـحم مـنـذـ مـلـاـيـنـ السـنـين بـطـرـيقـةـ مـمـاثـلةـ . مـنـ النـبـاتـاتـ والـعـيـوـانـاتـ المـنـيـةـ ، وـقـدـ اـصـبـحـتـ بـقاـياـهاـ المـتـحـفـرـةـ مـصـدـرـنـاـ الرـئـيـسـيـ لـلـوقـودـ . وـتـبـيـنـ الصـورـةـ حـسـلاـ الـبـيـتـ وـاسـتـخـدـامـهـ كـوـقـودـ لـأـحـدـىـ مـحـطـاتـ الـقوـىـ .



يطلق اـسـمـ بلاـنـكتـونـ نـبـاتـيـ عـلـىـ النـبـاتـاتـ المـيـكـرـوـسـكـوـبـيـةـ التـيـ تـطـفـوـ عـلـىـ مـاـ الـبـحـرـ ، وـهـيـ مـالـبـاـ طـعـالـبـ وـحـيـةـ الـخـلـيـةـ . تـسـمـيـ الـدـيـاـتـوـمـاتـ ، وـهـيـ كـاتـائـنـ اـسـاسـيـ فـيـ الـانتـاجـ الـفـدـائـيـ فـيـ الـبـحـارـ اـذـ اـنـهـ تـؤـلـفـ عـدـدـاـ لـلـعـيـوـانـاتـ الـدـيـقـيـةـ التـيـ تـعـيـشـ عـلـىـ الـكـائـنـاتـ الـبـعـرـيـةـ الـأـكـبـرـ . وـالـدـيـاـتـوـمـاتـ لـهـاـ أـصـدـافـ مـنـ الـبـلـيـكـاـ جـمـيـلـةـ جـداـ . وـقـتـسـتـغـرـجـ فـيـ الـبـقـاـيـاـ الـعـطـرـيـةـ لـهـدـهـ الـأـصـدـافـ وـتـسـتـخـدـمـ فـيـ الصـنـاعـةـ .

وتتحول إلى مواد عضوية وهذه المواد

تشـرـىـ التـرـبـةـ وـتـسـهـلـ اـخـتـرـاقـ الـجـذـورـ لـهـاـ . كـمـاـ اـنـهـ تـسـاعـدـ عـلـىـ اـمـسـاكـ التـرـبـةـ بـالـمـاءـ وـتـقـدـمـ الـعـنـاصـرـ الـمـعـدـيـةـ التـيـ تـسـتـخـدـمـهـاـ النـبـاتـاتـ فـيـ صـنـعـ الـفـدـاءـ .

تأخذ النـبـاتـاتـ ثـانـيـ اـكـسـيدـ الـكـربـونـ مـنـ الـهـوـاءـ وـتـسـتـخـلـصـ مـنـ الـكـربـونـ لـتـصـنـعـ مـنـهـ الـفـدـاءـ . فـيـ مـقـابـلـ ذـلـكـ تـخـرـجـ النـبـاتـاتـ اـلـاـكـسـيـجـيـنـ الـذـيـ تـتـنـفـسـهـ اـلـحـيـوـانـاتـ وـتـسـتـخـدـمـهـ فـيـ اـحـرـاقـ الـفـدـاءـ .

وـقـدـ اـصـبـحـ الـاـنـسـانـ الـآنـ قـادـراـ عـلـىـ تـفـيـرـ التـواـزـنـ الـطـبـيـعـيـ فـيـ الـدـنـيـاـ ، فـاـذـاـ

رـشـشـنـاـ الـمـحـاـصـيلـ بـعـرـكـبـاتـ كـيـماـوـيـةـ لـقـتـلـ الـآـفـاتـ فـانـاـ نـقـتـلـ أـيـضاـ الـحـشـراتـ التـيـ تـاـكـلـ الـآـفـاتـ ، مـاـ يـفـسـحـ الـمـجـالـ لـزـيـدـ

مـنـ الـآـفـاتـ وـبـذـاـ يـصـبـحـ لـزـاماـ عـلـيـنـاـ زـيـادـةـ

الـرـشـ .

الـطـبـيـعـةـ تـعـيـدـ دـوـرـةـ النـفـاـيـاتـ :

انـ الدـنـيـاـ لـمـ يـضـفـ إـلـيـهـاـ شـيـءـ وـلـمـ تـنـقـصـ شـيـئـاـ مـنـذـ مـلـاـيـنـ السـنـينـ . باـسـتـثـنـاءـ الطـاـقةـ التـيـ تـسـقـطـ عـلـيـهـاـ فـيـ صـورـةـ ضـوءـ الشـمـسـ . وـأـغـلـبـ موـادـ الـأـرـضـ لـاـ تـفـقـدـ وـلـكـنـهاـ تـتـحـولـ باـسـتـمرـارـ مـنـ صـورـةـ إـلـىـ أـخـرـىـ . وـبـمـرـورـ مـلـاـيـنـ السـنـينـ نـشـأـتـ عـلـىـ الـأـرـضـ كـائـنـاتـ مـعـقـدةـ . وـتـوـجـدـ هـذـهـ الـكـائـنـاتـ كـلـهـاـ بـالـطـبـيـعـةـ مـرـتـبـطـةـ بـعـضـهـاـ بـعـلـاقـةـ مـعـقـدةـ ، وـتـسـمـيـ هـذـهـ الـعـلـاقـاتـ تـواـزـنـ الـطـبـيـعـةـ . وـقـدـ اـصـبـحـتـ نـظـرـيـةـ اـعـادـةـ دـوـرـةـ الـمـوـادـ شـائـعـةـ جـداـ . وـعـلـىـ أـيـةـ حالـ ، فـقـدـ كـانـتـ الـطـبـيـعـةـ تـعـيـدـ دـائـيـاـ دـوـرـةـ نـفـاـيـاتـهـاـ . تـتـحـلـلـ أـجـسـادـ النـبـاتـاتـ وـالـحـيـوـانـاتـ الـمـيـتـةـ وـالـنـوـاتـجـ الـعـرـضـيـةـ كـاـوـرـاقـ الـخـرـيفـ وـرـوـثـ الـحـيـوـانـاتـ بـفـعـلـ الـكـائـنـاتـ الـدـيـقـيـةـ

عـالـمـ الـبـلـوـطـ :


تعـيلـ شـجـرـةـ الـبـلـوـطـ نـظـامـاـ كـامـلاـ مـنـ الـعـيـاهـ ، فـالـشـجـرـةـ تـبـنـيـ نـفـسـهـ بـاـنـ تـفـصـعـ غـدـاءـهـ مـنـ الـعـنـاصـرـ الـمـوـجـوـدـةـ فـيـ التـرـبـةـ وـالـهـوـاءـ . وـعـلـىـ الشـجـرـةـ تـبـيـشـ نـبـاتـاتـ أـخـرـىـ تـسـتـخـدـمـ جـذـعـهـاـ كـدـعـامـةـ لـهـاـ . وـالـنـوـءـ الـدـيـقـيـقـ الـأـخـرـىـ الـذـيـ يـنـمـوـ عـلـىـ الـقـلـفـ عـبـارـةـ عـنـ طـعـالـبـ صـفـيرـةـ . وـفـيـ كـلـ عـامـ تـاـكـلـ الـحـشـراتـ أـورـاقـ شـجـرـةـ الـبـلـوـطـ وـتـاـكـلـ الـسـنـاجـبـ بـدـورـهـاـ ثـمـ تـاـكـلـ الـطـيـورـ الـحـشـراتـ كـمـاـ تـبـنـيـ اـعـشـاشـهـ ثـوـقـ الشـجـرـةـ . وـتـنـفـتـ الـأـورـاقـ الـتـيـ تـسـقـطـ عـلـىـ الـأـرـضـ عـنـدـمـاـ تـكـبـرـ الشـجـرـةـ فـيـ الـعـمـرـ وـتـمـوـتـ بـيـطـ . تـنـغـدـيـ الـحـشـراتـ وـالـفـطـريـاتـ عـلـىـ خـشـبـهـاـ وـيـاتـيـ طـائـرـ نـاقـرـ الـخـشـبـ بـدـورـهـ لـيـتـنـغـدـيـ عـلـىـ هـذـهـ الـحـشـراتـ وـفـيـ الـنـهـاـيـةـ تـسـقـطـ الشـجـرـةـ وـتـنـتـهـمـ اوـ تـحـلـ . بـعـدـ ذـلـكـ تـبـدـاـ نـبـاتـاتـ جـدـيـدـةـ فـيـ النـوـءـ عـلـىـ بـقـاـيـاـ الشـجـرـةـ .

آـفـاتـ الـمـحـاـصـيلـ :

اـذـ زـرـعـنـاـ آـلـافـ الـنـبـاتـاتـ بـنـفـسـ التـوـعـ فـيـ حـقـلـ وـاحـدـ . كـمـحـاـصـيلـ الـعـبـوبـ . وـهـنـاـ نـهـيـ ظـرـوفـاـ مـثـالـيـةـ لـلـآـفـاتـ وـالـأـمـراضـ . قـالـحـشـراتـ الـضـارـةـ ، مـثـلاـ لـيـسـتـ مـضـطـرـةـ لـلـبـحـثـ عـنـ الـفـدـاءـ بـعـدـاـ . وـحـشـراتـ الـمـهـدـ وـالـعـرـادـ تـنـكـاثـرـ بـسـرـعـةـ وـيمـكـنـهـاـ انـ تـدـمـرـ الـمـحـصـولـ . وـسـوـسـةـ الـقـطـنـ تـتـلـفـ مـحـاـصـيلـ الـقـطـنـ كـمـاـ تـاـكـلـ خـنـفـساـ . كـوـلـوـرـادـوـ ، مـحـاـصـيلـ الـبـطـاطـسـ .



سوـسـةـ الـقـطـنـ



خـنـفـساـ كـوـلـوـرـادـوـ


منـ

نباتات نادرة

ان واحدا من كل عشرة أنواع من النباتات الزهرية تعرض خطر الانقراض .



كاميلا جراناتام



السيف الذهبي



العنب اليشبي



أخيون

السهل أن نستخدم معلوماتنا في جعل الأرض الزراعية أكثر فائدة .

وهناك عدة أسباب تجعلنا نحاول حماية الأنواع التي في طريق الانقراض والمحافظة عليها ، وبعضها آية في الجمال بينما يساعدنا البعض الآخر في تفهم المزيد عن النباتات ، كما أن المواد المستخرجة من بعضها من الممكن أن تساعدنا في الطب والصناعة .

ونحن وحدنا القادرؤن على اتلاف نباتات العالم أو المحافظة عليها .

وفي بعض البلاد لا يسمحون للناس بقطف الأزهار البرية الشائعة حتى لا تنقرض من الوجود .

النباتات في خطر :

كثيرا ما تقرأ ان حيوانات معينة قد أصبحت نادرة ومعرضة للانقراض . كذلك توجد بعض النباتات في نفس الموقف . وقد يكون بعض هذه النباتات شيئا أساسيا في حياتنا .


وتقتطع في كل عامآلاف الأشجار لتسوية الأرض التي تحتها لبناء المدن وشق الطرق . وتموت ببطء الحيوانات التي تعيش في الأشجار والأرض من تحتها كما تموت الأزهار وباقى نباتات الغابة . وربما كان من غير اللازم أن تتلف كل هذه الأشجار . بل انه من

النبات النادرة في العالم كله سجلة في « الكتاب الدولي الأحمر للعلوم » . والسبب في ذلك هو تمكين الناس من معرفة اي النباتات معرضة لخطر الانقراض . والنباتات المعرضة لهذا الخطر اربعة . وزهرة كاميلا جراناتام مستدرعة حاليا . غير ان واحدة فقط بها الموجودة بصفة بحرية في هونج كونج . وتنمو زهرة السيف الذهبي فوق الجبال البركانية بجزيرة هاواي . ويسلق نبات العنب اليشبي بالقلين على اشجار الغابات . كذلك ينمو نبات الآخيون الشاذ في جزر كناري .

زهرة الربيع



لقد زاد اهتماما في البقاء على جمال سياجات الأشجار حتى اتنا نسينا النباتات التي تمو داخلها وعندما نرش السياجات بمبيدات الأعشاب فان كثيرا من النباتات البرية الموجودة تموت هي الأخرى تبعا لذلك . ولا تبقى النباتات البرية على قيد الحياة في السياجات ، مثل زهرة الربيع ، الا اذا زادت العناية بالسياج مع عدم تقطيمه سوى مرة واحدة في السنة .



حقائق وأرقام

١٥ - بذور لصيد الأسماك (الطيور) :

تكون التمار البذرية شجرة البيسونيا التي تنمو في بعض الجزر الموجودة في جنوب البا西يفيكي لزجة جداً ، وإذا سقطت مجموعة منها فإنها تصعب فخا للطيور والفتران الصغيرة التي تستبيك بها بدون أمل في النجاة .

١٦ - العرقوسوس

تستخدم خلاصة جذور نبات العرقوسوس في صنع العلوى . والعرقوسوس نبات موطنه جنوب أوروبا .

١٧ - شجرة قديمة المدفع :

توجد في جويانا شجرة كبيرة تحمل ازهاراً على جذعها ، وتنبض لتصبح ثماراً خشبية كبيرة مستديرة تتخل من الجذع كما لو كانت قد ادفأه مدفعية وضعت فوق الشجرة خطأ .

١٨ - ندى العسل :

تفندى حشرات المن والعنزة الخضراء على الأوراق بآن تتصب عصاراتها . وتفرز الفانوس من العصارة من جسمها . وكثيراً ما يتسلق النمل الشجرة لجمع هذا السائل العلو الذى يطلق عليه اسم ندى العسل . وفي هذه الآثناء يسقط جزء كبير منه على الأوراق وعلى الأرض من تحتها . وتكون هذه الظاهرة واضحة في الصيف خاصة تحت أشجار التزيتون صيفاً .

١٩ - نباتات النمل :

كثيراً ما يصنع النمل اعشاشه في التجاويف الموجودة داخل الأشجار . وبعض النباتات توجد بها مستعمرات نمل دائمة أو الاسم اللاتيني للنملة هو ميرمكس . وفي جنوب شرق آسيا يوجد نبات اسمه ميريكوديا ، وهو يعيش على أغصان الأشجار الاستوائية . والأشجار ذات ساقان صغيرة سميكه مليئة بالدهاليز المقوفة التي يعيش فيها النمل الذي يساعد النبات بمحاجمة أي شيء يمسه .

٢٠ - سوم المحاكمة والتعذيب :

عندما كانت بعض المجتمعات المشائخية تشبه في ارتكاب شخص ما لجريمة ، كانوا يحاكمون المتهم بالسم . وكانت السوم تصنع من عدة نباتات فإذا أصيب المتهم بالتسنم ثم شفى منه أصبح في نظرهم بريثاً . أما إذا مات المتهم فإن ذلك كان كافياً لاعتباره مذنبًا .

٢١ - التهاب الجلد :

بعض الأشخاص لديهم حساسية ضد نباتات معينة . في مثل هذه الحالات قد يؤدي لمس الشخص للنبات حكة جلدية . ونبات بريمولا بيكونيكا ، الذي يزدوج في الربيع في الأصحر ، يمكنه أن يفعل نفس الشيء مع بعض الأفراد .

٨ - قلف البتولا :

ان قلف البتولا شديد المقاومة للماء . وقد اكتشف هنود أمريكا الشمالية انه ذو فائدة كبيرة في صنع الغلاف الخارجي لزوارقهم .

٩ - ورقة الشاي :

كانت ورقة الشاي تستخدم في الصين منذ الفين وربما ثلاثة آلاف سنة ، وكانت تستخدم كدواء وليس في صنع مشروب الشاي .

١٠ - أبيكا كوانها :

وكثيراً ما يختصر هذا الاسم إلى أبيكاك ، وهو عقار طبى يستخدم في علاج التزلات الشعبية والسعال الديكى ، وكثيراً ما يستخدم في أدوية السعال . وهو يستخلص من الجذور الملحمية لأحد نباتات أمريكا الجنوبية .

١١ - نباتات في شعار النبالة :

لقد استحدثت في القرن الثاني عشر نوع من الخوذات ليرتدوها في المعارك . وكانت تختلف عن الخوذات القديمة إذ كانت تغطى الرأس والوجه مما أدى كثيراً إلى عدم تعرف الفرسان على بعضهم البعض أثناء القتال . وللتغلب على هذه المشكلة كانوا يضيفون شعارات خاصة على أسلحتهم ودروعهم . وكثيراً ما كانت النباتات تستخدم كشعارات . لكل عائلة شعارها . وأشهر هذه النباتات زهرة السوسن التي اتخذها ملوك فرنسا شعاراً لهم ، وكان أساسه زهرة الأيريس .

١٢ - المعشبة :

المعشبة بناء يحتفظ علها النبات فيه بعيناته النباتية المجففة . توضع العينات على صحف من الورق بعد ترتيبها بحيث تجمع النباتات المشابهة معاً وهي تستخدم . بعد توصيفها ، كمراجع ، فإذا أراد عالم النبات أن يسمى نباتاً جديداً ، فإنه يضاف إليه بما عنده من عينات مخزونة :

١٣ - اللوف :

ليفة العمam المعروفة عبارة عن جزء من ثمرة نبات اللوف ، الذي هو من أقرباء الخيار . والواقع أنه بقايا ليفية جافة من الثمرة بعد نزع غلافها وبذورها .

١٤ - البندق الهندي :

عبارة عن بذور نبات استوائي متسلق توجد أحياناً على شواطئ بريطانيا . . . ويعمل تيار الخليج هذه البذور بحيث تؤدي إلى تحرك البذرة ، وإذا سُخنت البذرة قليلاً اهتزت اليرقة داخلها وتبدو البذرة كما لو كانت تتحرك .

١ - الشمرة العجيبة :

توجد في غرب إفريقيا شجنة صغيرة تدعى سنبيلم ذات ثمار عجيبة . فعندما يأكلها الإنسان يصبح طعم كل شيء بعد ذلك حلواً . والسبب في ذلك هو وجود مادة في الشمرة تؤثر في حلمات الذوق باللسان ، وحتى الليمونة يصبح طعمها حلواً غير أن تأثير هذه التمار يزول بعد فترة .

٢ - أطول الأشجار الحية :

أن أطول الأشجار هي شجرة الخشب الأحمر التي تنمو في ساحل كاليفورنيا ويبلغ طول احدها ١١١ متراً [٣٦٤ قدم] . ويبلغ ارتفاع أطول شجرة صمع في أستراليا ٩٩ متراً [٣٢٦ قدم] ، أما توب دوجلاس بولاية واشنطن فيبلغ ارتفاعها ٩٨ متراً [٣٢٤ قدم] .

٣ - أكبر الأشجار سماكاً :

يبلغ قطر شجرة السرو الضخمة في تول بالكسيك ١١ متراً [٣٦ قدم] عند قاعدتها ، أي أن محيط جذعها يربو على ٣٤ متراً [١١٣ قدم] .

٤ - البخور :

عبارة عن راتنج يجمع من شجرة تنمو في الصومال والجزيرة العربية . وقد كان البخور ضمن الهدايا التي أحضرها أحد السحرة المجروس لل المسيح الطفل وما زال يدخل في مكونات بخور الكنائس حتى الآن .

٥ - النباتات الحساسة :

هناك عدد من النباتات التي تتأثر باللمس أشهرها نبات الست المستحبة (ميمودا) التي تهدل وريقاتها بسرعة بمجرد لمسها .

٦ - المن :

أن المن الذي ورد ذكره في الانجيل ، والذي كان الاسرائيليون يأكلون منه في الصحراء قد يكون آلة من الأشتان التي تنمو على الصخور في المناطق الجافة بالشرق الأوسط . وقد تقتلع العواصف النباتات أحياناً وتذروها الرياح في قاع الوادي حيث تجتمع في طبقات يبلغ سمكها بضع سنتيمترات . هذه وهناك أيضاً مواد نباتية أخرى يطلق عليها اسم المن .

٧ - البفلة المكسيكية النطاطة :

قصص كثيرة من العشرات يقصها في البذور أثناء تكوينها حتى يتسمى للحشرة الحديثة أن تتدلى أثناة نموها على الفدا ، المغزون بالبذرة . وفي المكسيك تكون احدى يرقات الفراش أحياناً نشطة داخل البذرة بحيث تؤدي إلى تحرك البذرة ، وإذا سُخنت البذرة قليلاً اهتزت اليرقة داخلها وتبدو البذرة كما لو كانت تتحرك .

شرح الكلمات

حزازيات :

واحد من اهم الاقسام النباتية ، ويشمل
الحزازات الزاحفة والحزازات القائمة .

حزم وعائية :

حزم من العروق تربط الاجزاء، الحية للنبات
بعضها ، وهي تنقل المواد الخام من الجذور الى
الأوراق وتنقل الغذاء من الأوراق الى باقي اجزاء
النبات وهي تدعم انسجة الساق ايضا .

حفريات :

بقايا متحللة او حيوانات كانت موجودة قبل
التاريخ ، وتوجد عادة في الصخور الرسوبيه .
وكانت هذه البقايا تحول بالضغط الى فحم .
وحياناً كانت تختفي هذه البقايا داخل الصخور
قاركة مكانها مليئاً بمواد معدنية وهناك نوع ثالث
امثلات انسجتها بالمواد المعدنية قبل ان تنضفط
ما ادى الى حفظ تركيبها .

حلمات :

نوات تتكون عند قاعدة بعض انواع الصبار ،
وعده ، عندما تنمو ، تكون نباتات جديدة .

حولي :

نبات يزهر وينتاج البذور ويموت في عام
واحد .

خلايا :

الوحدات الأساسية التي يتكون منها جسم
جميع النباتات والحيوانات . والخلايا النباتية لها
جدار مصنوعة من السليولوز .

دائم الخضر :

اسم يطلق على النباتات ، وبخاصة الاشجار ،
التي لا تنفس اوراقها في الشتاء . وكلما سقطت
منها اوراق قديمة نمت بدلاً منها اوراق اخرى
وبذلك لا تتعري فروعها من الاوراق ابداً .

دورة زراعية :

طريقة تستعمل في الزراعة لتفادي فقدان
خصوبة الأرض . تزرع تباعاً لهذه الطريقة انواع
مختلفة من المحاصيل كل سنة في نفس الرقعة
المزروعة .

ثغور :

فتحات دقيقة على السطح السفل للأوراق يتم
عن طريقها تبادل الغازات . كذلك يخرج الماء الزائد
عن طريقها اثناء النسخ .

ثنائي الحول :

نبات يستغرق عامين كي يكمل دورة حياته .
وهو يزهر وينتج البذور في عامه الثاني .

جذور :

اجزء النبات التي تقوم بامتصاص الماء والأملاح
المعدنية من التربة . كذلك تقوم الجذور بتشتيت
النبات . وتستخرج جذور بعض النبات وتختزن الغذاء
للنبات .

بناء ضوقي :

عملية صنع الغذاء في النباتات الخضراء .

بوبيضات :

اجزء الزهرة التي تحتوى على الجاميتات او
الخلايا التكاثرية المؤنثة .

بيتسن :

مادة تتكون من بقايا الحزازيات بعد تحملها
جزئياً .

تعطيع :

وسيلة من وسائل الانتشار يؤديها رجل
الحديقة بان يصل ساق نبات بجذر نبات آخر .
ويعرف الجذور المستعمل ، الذي يكون معه جزء ، من
الساق ، بالأصل . اما الساق المنقول فيعرف
بالطعم .

تطور :

عملية الانتخاب الطبيعية التي ادت الى نشوء
نباتات وحيوانات حية معقدة . وقد ادى الصراع
على الحياة في دنيا الاحياء الى بقاء اقوى الكائنات
وقد نتج عن ذلك ، عبر ملايين السنين الى افراد
تطور العرق الجديد .

تكاثر جنسي :

في النباتات . عملية تتم عندما تتحد خلايا
النبات المذكورة بالخلايا المؤنثة لتكون خلية بيفية
ملقحة .

تكاثر حضري :

يحدث هذا التكاثر عندما ينتج النبات نباتاً
جديداً من جزء عادي من جذره او ساقه او ورقة .

تكافل :

علاقة توجد بين نباتتين مختلفتين يعيشان معاً
على بعضهما لفائدة كليهما .

تلقيح :

عملية تحدث عندما تستقر حبة لقاح على مسم
زهرة من نفس النوع .

ثاني اكسيد الكربون :

غاز عديم اللون يتكون عندما تخترق المواد
المحتوية على الكربون في وجود الاكسجين . ويحتوى
الفلاف الجوى حول الأرض على 0.3% في المائة
ثاني اكسيد الكربون . ويستخدم النبات هذه
الغاز في عملية صنع الغذاء .

ابصال :

تالف من الساق المنضغط والأوراق ، وقد
تحورت الأوراق كي تخزن داخلها الغذاء . وتتكون
ابصال جديدة بين طيات البصلة الأم .

اخصاب :

بعد التلقيح من حبة اللقاح الى اسطل انبوب
يخترق القلم حتى يصل الى البويبة ويهدى الجزء
المذكور من حبة اللقاح خلال الانبوب ويتحدد مع الجزء
المؤنث الذي يسمى البويبة .

أرض هراحة :

ارض ترك دون زراعة بعد جنى المحصول
بفرض اراحةها .

اسدية :

الجزء المذكور من الزهرة ، وهو يتكون من
حامل طويل يدعى الخيط الذي يوجد في طرفه
منك يحتوى على اللقاح .

اشنة :

نبات مركب يتالف من فطر وطحلب يعيشان
معاً في تكافل .

اكسجين :

غاز عديم اللون يؤلف خمس الهواء الذي
تنفسه . تستخلص النباتات والحيوانات الاكسجين
من الجو وتستخدمه في استهلاك غذائها . كذلك
ينتاج النبات الاكسجين كنتائج عرضي لعملية البناء
القصوى .

أكلة اللحوم :

هي التي تتغذى على اللحوم ، تقتصر النباتات
أكلة اللحوم العشرات لاستخلاص التراثون من
 أجسادها .

أنباتات :

تشتت البذرة عندما تهتز الماء فتنتفخ وتبرز
البادرة من غلاف البذرة . ويبرز العذير اولاً عادة
يليه ألساق الصغير الذي يتجه في نموه الى اعلى .

أوراق :

اجزء النبات التي تصنع الغذاء بعملية البناء

القصوى :

الأجزاء الوالعية في الزهرة . كذلك فهي
تهدى العشرات الملقحة وتقودها الى اجزاء التكاثر
في الزهرة .

بكتيريا :

كائنات ميكروسوبية يتالف اغلبها من خلية
واحدة . وبعض هذه الكائنات يصنع غذاء بنفسه ،
غير ان كثيراً منها يعيش على نباتات وحيوانات
آخر .

بلانكتون نباتي :

نباتات ميكروسوبية توجد في البحر .

جينين :

جزء البدرة الذى ينمو ليكون نباتاً جديداً وهو مزود بمخزن غذائى داخل البدرة .

ذوات الفلقتين :

أحدى طائفى النباتات الزهرية . عندما ينمو جينين ذو فلقتين فى البدرة تكون له ورقتان بذريةتان أى فلقتان .

رمى :

نبات يعيش على بقايا نباتية أو حيوانية ميتة

ريزومات :

سيقان أرضية تنتجه بعض النباتات . وتنتج من الريزوم عادة نباتات جديدة .

رجيق :

سائل سكري تنتجه الأزهار لجذب العشرات .

رى :

سقى الأرض صناعياً في المناطق الجافة . وكتيراً ما تستخدم القنوات والخزانات والآبار في الري .

زهرة :

الجزء التكاثرى في النبات . كثير من الأزهار لها كلاً العضوين . المذكر والمؤنث ، بينما بعضها لها اعضاً مذكرة أو مؤنثة فقط .

لقالح :

حبوب تحتوى على الجاميات المذكورة ، وهي خلايا تكاثيرية .

مبيد فطري :

اسم يطلق على آية مادة كيماوية يمكن استخدامها للسيطرة على الأمراض الفطرية . وأغلب هذه المواد يذوب في الماء بحيث يمكن رشها على الفطر المرضي . ولما كانت الفطريات نباتات ، لذا كان من العسير العثور على مبيد كيميائي يقتل النبات المتطل للدون الأضرار بالنبات الأصل .

مبيبص :

جزء الزهرة الذي يحتوى على البوبيضات .

متتساقطة الأوراق :

اسم يطلق على الأشجار التي تسقط أوراقها في الخريف .

مجذبة :

كلمة توصف بها الأرض التي استهلكت منها المواد العدنية الالزمة لنمو النباتات .

مستوطنة :

نباتات تعيش بالطبيعة في مكان واحد فقط من العالم .

معرأة البندور :

طائفة النباتات التي تنتج بذوراً لا تكون محصورة في داخل ثمرة وإنما تكون داخل مخروط خشبي . وهي تتكون من قسمين رئيسين هما المخروطيات والسايكاديات .

والسايكاديات نباتات تشبه النخيل كانت منتشرة حتى زمن الديناصورات .

مع فهو :

نبات لا يموت في الشتاء بل يعيش بضع سنوات .

عالم الحفريات النباتية :

عالم في النبات يدرس تركيب الحفريات .

عشب :

اسم يشير عادة إلى النباتات الزهرية التي ليست لها ساق مستديمة ، أي التي ليست لها ساق خشبية . ويستعمل الاسم أيضاً للدلالة على النباتات العشبية التي تستخدم أوراقها في الطهي كمادة منكهة ، والتي يطلق عليها اسم اعشاب الطهى .

مغطيات البدور :

نباتات تزهر وتعطى بذوراً محصورة .

مناطق معتدلة :

مناطق في العالم ، تقع أحدهما بين المنطقة المتجمدة الشمالية ومدار السرطان ، والأخرى بين المنطقة المتجمدة الجنوبيه ومدار الجدي .

منطقة حارة :

الجزء من العالم الذي يقع بين مدارى السرطان والجدي .

مواد معدنية :

أملاح معادن يتمتصها النبات خلال جذوره للتغذية . والعناصر الأساسية التي تؤخذ من التربة هي النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم . ويعتاج النبات أيضاً كي ينمو نحو سليماناً إلى آثار طفيفة من حوالي تسعه عناصر أخرى .

هيسن :

الجزء اللزج في طرف القلم وهو الذي يستقبل اللقاح .

نباتات لا زهرية :

وهي تشمل البكتيريا والطحالب والسرافخ والحزازات القائمة والفترىات والحزازات الزاحفة . وتتكاثر أغلبها بواسطة الأبواغ . أما الباقى منها فيتكاثر بانقسام الخلايا .

نباتات هوائية :

نباتات تستخدم نباتات أخرى كدعامة . وهي تتمس الماء من الهواء خلال أوراقها أو بواسطة جذور هوائية .

فتح :

عملية خروج الماء الزائد إلى الجو من أوراق النبات .

نسغ :

اسم يطلق على العصارات الموجودة داخل ساق النبات ، وهي تتألف من الماء وبضعة أغذية نباتية ذاتية .

هجين :

النبات الذي ينتج إذا خصبت بويضة نبات بلقاح نبات مختلف من أقربائه .

وحيدة الفلقة :

أو ذوات الفلقة الواحدة . أحد قسمى مغطيات البدور . عندما يتكون جينينها في البدرة تكون له ورقة بذرية ، أو فلقة واحدة .

نباتات خضراء :

نباتات تحتوى على الكلوروفيل وتجهز بذوراً بنفسها بعملية البناء الفضونى .

نباتات دنيئة :

اصطلاح عام يستخدم في وصف النباتات الأقل تقدماً ، وهي التي تتكاثر بواسطة الأبواغ أو الانقسام الخلوي البسيط .

نباتات راقية :

اصطلاح عام يستخدم للدلالة على النباتات الأكثر تقدماً ، وهي النباتات التي تنتج أزهاراً وبذوراً .

علم النبات :

دراسة النباتات دراسة علمية .

فلورا :

مجموعة نباتات تعيش مع بعضها في مساحة محددة . ويطلق الاسم أيضاً على كتاب يصف جميع الأنواع النباتية التي تعيش في مساحة معينة . فمثلاً ، يصف كتاب فلورا نيوزيلاند جميع النباتات البرية في نيوزيلاند .

قلم :

حامل يربط المسم والمبين .

كلوروفيل :

مادة موجودة في جميع النباتات الخضراء ، وهي حسنه في عملية منم الغذاء - اي - البناء الفضوني .

كورره :

ساق متعرجة تستخدم في اختران الفداء تحت الأرض . من الكورمات الجديدة من براعم جانبية .

لقالح :

حبوب تحتوى على الجاميات المذكورة ، وهي خلايا تكاثيرية .

مبيد فطري :

اسم يطلق على آية مادة كيماوية يمكن استخدامها للسيطرة على الأمراض الفطرية . وأغلب هذه المواد يذوب في الماء بحيث يمكن رشها على الفطر المرضي . ولما كانت الفطريات نباتات ، لذا كان من العسير العثور على مبيد كيميائي يقتل النبات المتطل للدون الأضرار بالنبات الأصل .

مبيبص :

جزء الزهرة الذي يحتوى على البوبيضات .

متتساقطة الأوراق :

اسم يطلق على الأشجار التي تسقط أوراقها في الخريف .

مجذبة :

كلمة توصف بها الأرض التي استهلكت منها المواد العدنية الالزمة لنمو النباتات .

مستوطنة :

نباتات تعيش بالطبيعة في مكان واحد فقط من العالم .

معرأة البندور :

طائفة النباتات التي تنتج بذوراً لا تكون محصورة في داخل ثمرة وإنما تكون داخل مخروط خشبي . وهي تتكون من قسمين رئيسين هما المخروطيات والسايكاديات .

والسايكاديات نباتات تشبه النخيل كانت منتشرة حتى زمن الديناصورات .




مع فهو :

نبات لا يموت في الشتاء بل يعيش بضع سنوات .


طرق زراعة النباتات

الابصال في الداخل :


ازرع بعض ابصال الداخل في الخريف ، وستجد مجموعة كبيرة وجميلة النظر في الربيع . ويمكن زراعة الابصال في خليط من تربة الأصيص ، او تربة الحديقة مخلوطة ببعض الرمل . و اذا استخدمت خليط تربة الأصيص فانه يلزم بلله بالما ، قبل الاستعمال . املا وعا ، او اصيضا لمنتصفه بالخليط ، ثم ضع ابصالك فوقه بحيث يكون سطحها المفلطح الى اسفل ولا تجعل الابصال متكدسة . اضف مزيدا من مزيج التربة حتى تحيط بباقي الابصال واحتفظ بها في دولاب مظلم جيد التهوية اثناء بدء نموها . تأكد ان مزيج التربة رطب بالما ، دائميا . بعد شهرين اخرج الأصيص من الدولاب ووضعه في مكان مشمس دافئ .



نرجس بري



تيوليب




جلاديوس



كروكس

هياست




كيف تصنع صندوق النافذة :

اذا كنت تسكن في شقة او منزل بلا حديقة فانه يمكنك عمل حديقة خارجية صغيرة . يحتاج الأمر الى قياس طول وعرض قاعدة نافذتك . ويعجب الا يقل عرض القاعدة عن ١٥ سم حتى لا يسقط صندوق النافذة .



وان كنت لا ترغب في شراء خشب جديد فانه يمكنك ان تصنع صندوقك من بعض الواح الخشب القديمة . اقطع الخشب بالنشرار الى ثلاث قطع متساوية بحيث يمكن طول كل منها اقل من طول قاعدة الشباك بعشرة سنتيمترات وبنفس الغرض تقربا . اصنع بعض الثقوب في احدى الحشبات اثنان مصرف المياه الزائدة . واجعلها قاعا للصندوق . ثبت القطعتين الاخريتين في قطعة القاع ، وعل جانبيها بالمسامير . ثم اقطع قطعتين صغيرتين من الخشب لتسد بها الحافتين . يحسن بعد ذلك دهان الخشب حماية له . عندما يجف الدهان فسح في قاع الصندوق بعض الحصى او الحجارة ثم اضف مزيج التربة واسفنته جيدا .

والواقع انه يمكنك ان تضع اي نوع من النباتات الصغيرة في هذا الصندوق مثلا كالمولييات المزهرة والاعشاب والايضي . اما في الخريف فانه يمكنك ان تزرع فيه الابصال التي تزهر في الربيع .

حديقة في زجاجة :




يمكنك عمل حديقة صغيرة جداً داخل زجاجة ، ولا تحتاج إلى عناء تذكر . ويتطلب الأمر زجاجة كبيرة ذات غطاء . ويمكنك شراء بروطمأن كبير ، وحيلاً لو كان مربعاً حتى لا ينتحر . ضع البرطمأن على جانبه وأفرش في قاعه - نائماً - بعض العصى لصرف الماء ، ثم ضع فوق العصى بعض خليط التربة أو التربة العادي الجديدة . بعد ذلك ضع نباتك في التربة وتأكد من أن جذورها مطمورة في التربة . يمكنك في هذا الوعاء زراعة نباتات صغيرة مثل الخزازيات والأيفي والسراغن والأشنات . كذلك يمكن إضافة بعض النباتات المائية كالبلنسج والبيجوتيا الصغيرة . ضع ما يكفي لبلل التربة قبل أن تغلق غطاء الوعاء . وتنمو النباتات في حالة جيدة إذا انت وضعت هذه الحديقة في مكان دافئ، هادئ، وليس في قسوة الشمس المباشرة . ولما كان تبخر الماء من الوعاء قليلاً ، لذا فانك لن تحتاج إلى كثرة رى النباتات .



البنور والبذور الخشبية :


عندما تأكل بعض الفاكهة كالعنبر أو البلح . احتفظ ببذورها بدلاً من التخلص منها لأنه من السهل زراعتها . انقع البذور في الماء بضع ساعات . اجمع بعض أكواب الزبادي الفارغة واتقبها في القاع للتهوية . بطن القاع بالعصى وأملأها بالتربة حتى سنتيمترتين من حافتها . ازرع في كل منها بعض البذور واروها بالماء حتى تبتل التربة . احتفظ بها في مكان دافيء، ولا حظ أن البذور سرعان ما تبدأ في النمو .



صحراء صغيرة :


اصنع صحراء صغيرة بنباتاتها الصبارية . انك تحتاج لهذا الأمر صندوقاً كبيراً غير مرتفع الجدار . املأه حتى منتصفه بخليط يتكون من جزء من الرمل وجزءين من خليط التربة . ويمكن الحصول على مجموعة من الصبار الصغير بسهولة . تزرع هذه النباتات في خليط الرمل والتربة وتحفظ في مكان دافيء، ويعرض لقوس الشمس الوفير . والصبار لا يحتاج إلى كثير من الماء خاصة في الشتاء .

تجفيف وضغط النباتات



كيف تضغط الزهور :


لو قيصر لك أن تقضي يوما في الريف إننا، الصيف ،
فقد تسولك الرغبة في لطف بعض الزهور البرية ،
او العشائش والأوراق ، واخذها الى المنزل لتجفيفها .
فإذا فعلت ذلك ، فلا تقطف غير الأشياء الشائعة ، ولا تقتلع
جذور النباتات اطلاقا . كذلك تتأكد من عدم اقتطاع
النباتات النادرة . ولكن تتأكد من ذلك خذ معك كتابا
عن النباتات للتعرف على الأزهار . وإذا لم تقم بزيارة
للريف يمكنك ان تكتفي بنباتات حديقتك . وعندما تبدأ
في تجميع ازهارك تتأكد من انها ليست مبللة . ويمكنك
بعد ذلك ان تضغطها بين ورقتي شفاف داخل كتاب ثقيل
او تضعها بين ورق الجرائد تحت السجادة . وإذا غيرت
الورق أكثر من مرة فان النباتات تجف سريعا وهي محظوظة
بألوانها . وبعد شهر تصبح النباتات صالحة للاستعمال .
كذلك يمكن ضغط الزهور في ضاغط الزهور الذي يمكن
شراؤه من المحلات .



استخدام الزهور المضغوطة :

عندما تتوفر لك مجموعة جيدة من الزهور
والعشائش والأوراق ، يمكنك تجميعها في هيئة
صورة . الصق كل زهرة على قطعة من الورق
او الكرتون او القماش الملون ، مستخدما قليلا من
الصمع الشفاف . ويمكن عمل إطار بالزجاج للصورة
بعد ذلك .

كذلك فمن الممكن ايضا استخدامك للزهور
المضغوطة في صنع كروت اعياد الميلاد : اطو بعضا
من الورق المقوى الى نصفين والصق احدى ازهارك
في الخارج . ويمكنك اضافة حافة ملونة واتكتب
تهنئتك في داخل الكارت .




لصق الزهور

قدر البوري :

اذا جمعت بعض نباتات الزهور العطرة مثل اللافندر والميموزا والورد ، فإنه يمكنك ان تفصل بتلاتها وزهورها وتحفظها لتصنع منها قدر بوري . وهذا اذا وضعه في غرفة ما فإنه يعطى هواها .

أكياس اللافندر :



اذا جمعت كمية كبيرة من ثمامات زهرة اللافندر ، فإنه من الممكن ان تقوم بتجفيفها لصناعة أكياس اللافندر . احضر قصاصات اى قماش فطني واصنع منها أكياسا صغيرة . املا الأكياس ، التي يمكن صنعها في أشكال مختلفة ، باللافندر المجفف وخيط فتحة الأكياس حتى لا تسقط منها الأزهار ثم ضع الأكياس في الدواليب والادراج التي تحتفظ فيها بملابسك . انها تجعل رائحة الملابس عطرة



استخدام البدور :

اجمع مجموعة من بذور مختلفة الأشكال والأحجام والألوان ، وجففها . ويمكن بعد ذلك استخدامها في صنع الصور . اجمع البدور على شكل ما والصقها على الورق او الورق المقوى بقليل من الصمغ النقي . هذا . ويمكن نظم البدور الكبيرة ، مثل بذور البطيخ والشمام في خيط وتصنع منها قلائد واساور .


خودل	
شمام	
برقال	
ـ	
ارذ	
ـ	
عباد الشمس	



تجارب على النباتات




قطع في قطعة البطاطس




تجربة لاثبات الاذموزية :

تأخذ النباتات الماء والأملاح العذبة من التربة عن طريق الجذور بعملية تعرف بالازموزية . واليك تجربة بسيطة تثبت لك هذه الظاهرة : قشر نصف درنة بطاطس كبيرة وافطع جزءاً من اسفل الجزء المقشر كي تجعل سطحه مستوياً واصنع حفرة وسط قطعة البطاطس عند سطحها الآخر . فضع قطعة البطاطس في طبق به ماء . لاحظ ان ماء الطبق سيسعد بالازموزية ويملا تدريجياً الحفرة في أعلى قطعة البطاطس .




النتح :

تفقد النباتات الماء بخارجه في الهواء عن طريق فتحات دقيقة في أوراقها . وتعود هذه الظاهرة بالنتح . ويمكنك اثبات وجود النتح بهذه التجربة البسيطة . خذ نباتاً في اصيص وضع حوله كيساً من البلاستيك ولف حافة الكيس حول الساق واربطها بقطعة من المطاط . او النبات جيداً وضمه في مكان شمس . لاحظ بعد نصف ساعة ان السطح الداخلي للكيس قد تفطر بالرطوبة التي هي عبارة عن الماء الذي نتح من اوراق النبات .



قطع مستعرض في الساق




كيف تعمل السيقان :


هذه تجربة تثبت ان الماء والأملاح العذبة تصدع في ساق النبات الى الأوراق . خذ عوداً من الكرفس وضعها في كوب الماء الملون بالحبر الاحمر . لاحظ بعد فترة تكون خطوطاً حمراً صاعدة في الساق الى الأوراق . واذا قطعت الساق عرضياً فانك ستشاهد بقى حمراً في الأماكن التي قطعت فيها العروق الخامدة للحبر الاحمر عبر الساق .

ويمكن اجراء هذه التجربة بطريقة مختلفة باستخدام زهرة فرنفل بيضا . شق ساق القرنفل طولياً بحيث ينشطر في اسفله الى شطرين . ادخل شطري الساق في كوبين احدهما به ماء ملون بحبر ازرق والآخر به ماء ملون بحبر احمر . بعد فترة يرتفع الماء حتى قمة الساق وت تكون الزهرة الى نصفين احدهما احمر والآخر ازرق .

الاتجاه الضوئي :



تنمو ساقان معظم النباتات الى اعلاه في اتجاه الضوء . وتعرف هذه الظاهرة بالاتجاه الضوئي . والنباتات تحتاج للضوء كى تصنع غذاءها بواسطة البناء الضوئي . وتشتت هذه التجربة حدوث الاتجاه الضوئي . خذ صندوقا كبيرا من الورق المقوى واقطع فتحة فى أحد جوانبه قريبا من اعلاه . فضع نباتا باصيص داخل الصندوق وتأكد من عدم دخول ضوء داخل الصندوق فيما عدا الفتحة التى صنعتها . ضع الصندوق في مكان شمس بحيث تواجه الفتحة الشمس . وبعد أيام قليلة افصر داخل الصندوق ولاحظ ان النبات قد بدأ يتشتت ويدير اوراقه في اتجاه الفتحة محاولا اقتناص الضوء .



البناء الضوئي :

والجزء الذى كان مقطى بورقة القصدير يتتحول لونه الى البني ، بينما يتتحول باقى الورقة الى اللون الأزرق . ويدل اللون الأزرق على وجود النشا ، اما اللون البني فدليل على ان هذا الجزء من الورقة لم يتمكن من صنع النشا . والفرق الوحيد بين الجزءين هو ان الجزء المقطى كان محروما من ضوء الشمس ، مما يجعلنا نستنتج ان ضوء الشمس على شرط لازم لعملية البناء الضوئي او انتاج الغذاء .

ورقة القصدير ، بعد ان تتعفن من وسطها على شكل صليب ، على ورقة نبات نوى اصبع باستعمال شريط لاصق . اترك النبات بضعة ايام في الشمس . اقطع الورقة من النبات وانزع عنها ورقة القصدير . انقع الورقة في كعول بعض ساعات للتخلص من بعض الكلوروفيل الاخضر . ضع بضع نقط من محلول اليود على الورقة ولاحظ اي اجزاء الورقة يتغير لونها .

تصنع النباتات الخضراوات غذاءها بعملية البناء الضوئي ، فهي تستخدم الطاقة من ضوء الشمس وغاز ثاني أكسيد الكربون والماء . كى تصنع غذاءها النشوي . فإذا حجبنا جزءا من ورقة نبات عن ضوء الشمس فترة من الزمن وكشفت عن النشا فيه لأمكن الاستدلال على أهمية وجود ضوء الشمس لعملية انتاج الغذاء ، اي البناء الضوئي . وتشتت التجربة التالية ذلك . ثبت اولا قطعة من


النبات :

تحتاج البذور للهواء والماء . كى تنبت . ويمكن الباب ذلك كما يلى :

خذ اولا بدورا جافة وضعاها على قطعة قطن جاف في طبق . ان هذه البذور لن تنبت لأنها معروفة من الماء رغم توفر الهواء .

خذ بضعة بذور وضعاها في طبق واغمرها في الماء بارد سبق غليه . صب بعضا من زيت الأكل فوق سطح الماء فيطفو الزيت ويمنع وصول الهواء للبذور . لن تنبت هذه البذور أيضا . رغم توافر الماء لها لأنها معروفة من الهواء .





خذ مجموعة ثلاثة من البذور التي سبق نقعها في الماء . ضع البذور في طبق فوق قطعة من القطن المبلل بالماء . وضع الطبق بما فيه في مكان دافئ . لالاحظ ان هذه البذور هي التي تنبت لتوافر كل من الماء والهواء .



طباعة وصياغة



طبعات صنعت بالشمار والتمر



طباعة الفواكه والخضروات

يمكن عمل طبعات لطيفة باستخدام التمر والخضروات . وتحتاج لذلك بضعة ثمار وخضروات مختلفة وسكينة حادة وورق وفرش وأصابع . القطع الثمرة أو الخضر إلى نصفين وادهن السطح المقطوع بالفرشة . اضغط السطح المدهون من الثمرة على قطعة من الورق لتصنع طبعتك . حاول عمل بضعة طرز مستخدما عدة أنواع من الفاكهة والخضير .

طبعات صنعت بالتمر




الطباعة بالبطاطس :

تحتاج لهذه الطباعة إلى درنة كبيرة من البطاطس . سكينة حادة ، دبوس شعر وبعض الورق والأصابع . القطع البطاطس إلى نصفين واصنعن دسما في السطح المقطوع مستخدما سكينة صغيرة أو ثانية دبوس الشعر . ادهن سطعها بالصبغ لتطبع بها . حاول أن تطبع بها حروف اسمك ولا تنس أن تكون صورة المزفف التي تصنعن مقلوبة . وباستخدام أصابع معينة يمكنك أن تطبع بها على القماش .


SARA

أوراق بالشمع :

تحتاج لهذا العمل أوراق نباتية سميكة وورق
لا ينفذ الشمع وأقلام من الشمع . ضع الأوراق فوق
سطح صلب وغطها بالورق . ذلك برفق على الورقة
بقلم الشمع .



طبعات بالبطاطس



طبعات بالبطاطس

قفف البشولا (تيل)

انقع القلف في الماء مدة يومين ثم اغله
 ساعتين . صفه قبل الصبغ .

أوراق النوار الأبيض (أبيض)

اغل الأوراق مدة ساعة قبل اضافة الصوف .

توت العليق (أزرق اردوazi)

اضف ٣٠ جراما من الملح لكل ٥٠٠ جرام من
العباد المسحوقة . اغلها بسبعة ثوان وصفها .

أوراق البيلسان (اخضر مصفر)

اغل الأوراق مدة ساعتين قبل اضافة الصوف .

الخور (بنى داكن أو أسود)

لا يحتاج الأمر الى تجهيز الصوف لهذه
الصبغة . انقع الثمار بسبعة ايام ثم اغلها نصف
ساعة قبل اضافة الصوف .

صباغة :

استخدم النباتات في صباغة بعض الصوف
الذى تكون قد جمعته بنفسك او حصلت من
الصوف الأبيض . تذكر ان بعض الأوراق والقفف
تكون سامة فاحترس . تحتاج لذلك الى ٥٠٠
грамм من نبات الصبغة لكل ٥٠٠ جرام من الصوف .
احضر دلوا او قدرًا كبيرًا من الالماسيوم او الحديد
المحلق او الصاج المطل بالميناء . ٩٠ جراما من
النسبة . ٣٠ جراما من كريم الطريظير . اذب
النسبة والطريظير في ١٠ لترات من الماء . وسخنها حتى
تدقق فقط . اضف ٥٠ جرام من الصوف وارفع
الحرارة ببطء . حتى تصل الى درجة الغليان ودعها
تغلي ببطء . وهدو . مدة ٥ دققيقة مع التعرير مرارا
او مرتين . اخرج الصوف واسكب المحلول واغسل
الدلو او القدر . جهز الصبغة مستخدما ١٠ لترات
ما . والنبات الذى اخترته . دع الصبغة تبرد
واضاف اليها الصوف . ارفع الحرارة ثانية ببطء .
حتى تصل درجة الغليان واستمر حتى يصبح
اللون جيدا . لاحظ ان اللون يصبح فاتحا نوعا
ما عندما يجف . اشطف الصوف وجففه .



فہرست

- رحيم ، نباتات ١١ ، ٢٦ ، ٥١
 روودندرون ١٣
 رى ٤٢ ، ٥١
 ريزومات ٥١ ، ٢٤ ، ٤٢
 زراعة ٢١ ، ٤٢ ، ٤٣
 زنبق الماء ٢٣
 زهرة . الاجزاء المذكورة ١٦ ، ١٦
 زهرة الربيع ٤٨
 زهرة مؤئنة (أجزاءها) ١٦ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٧
 زهور ، مضغوطه و مجففة ٥٤
 زوارق ٣٤ ، ٤٠ ، ٤٩
 زيتون ٣٧
 زيوت نباتية ٧ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٣٧
 ساق ، تركيب و وظيفة ١٥ ، ٢٢
 ساق ، تكوين الجذور منه ٢٥
 ساق . فوائده ٣٥ ، ٥١
 سبلات ١٨ ، ٥١
 سداة ١٦ ، ١٨ ، ٥١
 سذاب ، فصيلة ١٠
 سراغس ١١ ، ١٣ ، ٢٩ ، ٣٥
 سراغس شجرية ٣٨
 سلسلة غذائية ٦ ، ٢٦ ، ٤٧
 سليولوز ٥٠
 سوس ٤٧
 سيسال ٣٣ ، ٤٠
 سيفان جارية ٢٤ ، ٥١
 شاي ٣٢ ، ٤٩
 شجرة الصمغ ٤٩ ، ٣٩
 شجرة العشب ٣٩
 شجرة دانة المدفع ٤٩
 شعارات ٤٩
 شعير ٣٦
 شعيرات جذرية ١٥
 شمع ، من النباتات ٣٣
 شدفان ٣٦
 صابون ٣٧
 صبار ١٣ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٥٣
 صبار التين الشوكى ٤١
 صحراء ، صغيرة ٥٣
 صحراوية ، نباتات ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٠
 صندوق النافذة ٥٢
 صوب ٩ ، ٨
 ضوء الشمس ٣٢ ، ٢٦

